

ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

| Είδος στόχος | Πεδίο εφαρμογής | Δοσολογία |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ποντικός (<i>Mus musculus</i>) | Εσωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια | 5 έως 15γρ. δολιμάτος ανά θέση δόλιωσ. <u>Σε ελαφριές προσβολές</u> οι θέσεις δόλιωσ θα πρέπει να απέχουν 4μ. <u>Σε βαριές προσβολές</u> οι θέσεις δόλιωσ θα πρέπει να απέχουν 2μ. |
| Αρουραίοι (<i>Rattus rattus</i> , <i>R. Norvegicus</i>) | Εσωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια | 60 έως 300γρ. δολιμάτος ανά θέση δόλιωσ. Η παραπάνω δοσολογία μπορεί να επιτευχθεί με 2 έως 10 κύβους των 28 γρ. <u>Σε ελαφριές προσβολές</u> οι θέσεις δόλιωσ θα πρέπει να απέχουν 10μ. <u>Σε βαριές προσβολές</u> οι θέσεις δόλιωσ θα πρέπει να απέχουν 5μ. |

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Η χρήση των δολιμάτων προορίζεται για εσωτερικούς χώρους κτιρίων και γύρω από κτίρια αστικών ή αγροτικών περιοχών. Πριν την εφαρμογή πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών. Οι θέσεις δόλιωσ θα πρέπει να είναι προφυλαγμένες και μη προσίτες από ανθρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά.

Τα δολιμάτα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εντός δολιματικών σταθμών. Δολιματικά οι οποίοι θα πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν δολιμάτα, ώστε να μην συγχέονται με όβειους δολιματικούς σταθμούς. Κατά την τοποθέτηση των δολιματικών θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσης τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα.

Η δόλιωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια από την παρουσία τρωκτικών. Οι θέσεις δόλιωσ πρέπει να αλλάζουν περιοδικά.

Η τοποθέτηση των δολιμάτων γίνεται χωρίς να έρθουν σε επαφή με τα χέρια.

Τα δολιμάτα πρέπει να επηρεάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κατά προτίμηση την 4η και 7η ημέρα μετά την πρώτη εφαρμογή και ακολούθως ανά 7 ημέρες) και να αναπληρώνονται μέχρι να σταματήσουν να τρώγονται από τα τρωκτικά.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αντιπηκτικών δραστικών ουσιών σε μέρη όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας των τρωκτικών σε αυτές τις δραστικές ουσίες. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται ανάληψη των δολιμάτων, χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες κάθε φορά.

Όταν τα δολιμάτα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολιμάτα θα πρέπει να επισημαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολιμάτα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολιμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης. Τα δολιμάτα θα πρέπει να παρέχονται στο χρήστη εντός συσκευασίας. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιέχεται ποσότητα δολιμάτων που να είναι ικανή να χρησιμοποιηθεί για μια θέση δόλιωσ (ποτικίου ή αρουραίου).

Οι δολιματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία όπου ζουν, διέρχονται ή τρέφονται τα τρωκτικά και κατά προτίμηση θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος.

Η χρήση των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην ετικέτα του.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ:

Πωλείται από καταστήματα εμπόρου γεωργικών φαρμάκων. Επιτρέπεται η πώληση του σε συνεργεία μιστοκνίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(PROD. DATE): (LOT No):

Notrac™

WAX BLOCK BAIT

Bromadiolone (Βρομαδιολόν) 0,005%
Ετοιμόχρηστο δολιμά σε κηρώδεις κύβους (BB)

Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας Υ.Α.Α.&Τ : ΤΠ14-0087/29-07-2014

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Bromadiolone 0.005 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β
Πιέριετι του πικραντικού – αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate
Χρώμα μπλε

Ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των ποντικών (*Mus musculus*) και των αρουραίων (*Rattus rattus* και *R. norvegicus*).
Αρκεί ένα και μόνο γεύμα από τα τρωκτικά για να ληφθεί με το δολιμά η θανατηφόρος δόση.



“ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ”

Κάτοχος της έγκρισης, Παρασκευαστής του σκευάσματος: Bell Laboratories, Inc-European Division, Chaucer House, Chaucer Road CO10 1LN, Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπεύθυνος επικοινωνίας, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: **ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.**

Αγ. Παύλου 39, 121 32 Περιστέρι, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 8542220, 210 8542270, Fax. 210 8542253
www.protecta-health.gr • e-mail: info@protecta-health.gr

Το Notrac είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Bell Laboratories Inc.-WI, U.S.A.

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΙΛΑ

1,8 5 8 10

ΒΑΡΟΣ ΚΥΒΟΥ

5gr 15gr 28gr

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Μακριά από παιδιά
- Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση
- Φυλάσσεται κλειδωμένο

Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησασούν άλλα ζώα και πουλιά (αγροτικά ή μη). - Πλύνετε τα χέρια και τα ακάθλιτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή κανισίτε και μετά την εφαρμογή. - Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να φορούν μάσκα και προστατευτικό εξοπλισμό κατά τον χειρισμό των δολιμάτων.

Όταν τα δολιμάτα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολιμάτα θα πρέπει να επισημαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολιμάτα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολιμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.

“Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολούθηστε τις οδηγίες χρήσης.”

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

- Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Πρώτες βοήθειες: Η βρομαδιολόν (bromadiolone) αποτελεί ένα αντιπηκτικό που ενδοχοιμώνας να προκαλέσει αιμορραγία (η έναρξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση). Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος προθρομβίνης (INR) στην εμφάνιση του περιστατικού ακόμη και σε 48-72 ώρες μετά την έκθεση. Αν ο χρόνος προθρομβίνης είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγήστε 5-10 mg βιταμίνης K1 (φτυομεναδιόν) μέσω αργής ενδοφλέβιας έγχυσης (100 μg/kg σωματικού βάρους για παιδιά). Ενδοχοιμώνας να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη K1 (από το στόμα ή ενδοφλέβια) για αρκετές εβδομάδες.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, κρατήστε τα μάτια ανοικτά και ξεπλύνετε αργά και απαλά με νερό για 15-20 λεπτά της ώρας. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής –αν υπάρχουν– μετά από τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να ξεπλύνετε τα μάτια. Παρακολούθηστε τον ασθενή για συμπτώματα δηλητηρίασης (ρινόρροιας, αίμα στα ούλα, αιμόπτυση, ξαφνικός και ασυνήθιστος πόνος στην κοιλιακή χώρα, αίμα στα ούρα, αύξηση χρόνου πήξης του αίματος).

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν την επόμενη χρήση του. Παρακολούθηστε τον ασθενή για συμπτώματα δηλητηρίασης όμοια με τα παραπάνω. Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό εκτός και αν συμβουλευθείτε σχετικά από ιατρό ή το κέντρο δηλητηρίασεων. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.

Η χρήση του να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τα άτομα που ακολουθούν αντιπηκτική αγωγή.

Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 (υπό ιατρική παρακολούθηση).

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηρίασεων: 210 77 93 777

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση του στο περιβάλλον

Αναζητήστε τους νεκρούς αρουραίους ή ποντίκια και θάψτε τα ή κάψτε τα μαζί με τυχόν υπόλοιπα δολιμάτος που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή που δεν έζησαν φάγοντάς από τα τρωκτικά. Τα αναπηκτικά τρωκτικοκτόνα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολιμάτα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος:

Τα δολιμάτα δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Μην φαγωμένα δολιμάτα θα πρέπει να απορρίπτονται μέσω καύσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κατά μέσα συσκευασίας δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και θα πρέπει να καταστρέφονται με οξίμιμο και να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.