



sencor[®]

600 SC

100 ml e

Αρ. Άδειας Διάθεσης
στην Αγορά Υ.Π.Α.Π.Ε.:
70115/3-3-2015

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Εγγ. σύνθεση: metribuzin 60% β/ο, Βοηθ. ουσίες: 43,9% β/β

Ζιζανιοκτόνο

για την καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε καλλιέργειες πατάτας, τομάτας, σόγιας, καρότου και σπαραγγιού.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι.

Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

ΠΡΟΣΟΧΗ



50

ΣΕΝΚΟΡ 600 SC

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Το Sencor 600 SC εφαρμόζεται προφυτρωτικά και μεταφυτρωτικά για την καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστώδων ζιζανίων σε καλλιέργειες πατάτας, τομάτας, σόγιας, καρότου και σπαραγγιού.

Η δραστική ουσία metribuzin είναι εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο (υποομάδα triazinones) και σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη λειτουργία του φωτοσυστήματος II της φωτοσύνθεσης. Το metribuzin προσλαμβάνεται από τη ρίζα και το φύλλωμα των ζιζανίων και παρουσιάζει ακροπέταλη κίνηση μέσω των αγγείων του ξύλου.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ομοιόμορφος ψεκάσμος του εδάφους ή του φυλλώματος με 40-50 λίτρα νερό στο στρέμμα. Το έδαφος πρέπει να είναι υγρό και ψιλοχωματισμένο.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:

• ΚΑΡΟΤΟ:

Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια. **Μεταφυτρωτικά:** Εφαρμογή όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2 φύλλων. **Δόση:** 60 κ. εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-50 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1.

• ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια.

A. Προφυτρωτικά: Εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά μέχρι το κέντρωμα των σπόρων. **Δόση:** 46 κ. εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-50 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1 ή

B. Μεταφυτρωτικά: Εφαρμογή στο στάδιο των 2-4 πραγματικών φύλλων μετά από αιλάκωμα ή το σχηματισμό «τραπεζιών». **Δόση:** 46 κ. εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-50 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1 ή

ΣΕ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΟΜΑΤΑ:

Εφαρμογή 20 ημέρες μετά τη μεταφύτευση και όταν τα φυτά έχουν «ριζοπιάσει» και έχουν 3-4 πραγματικά φύλλα. Όταν εφαρμόζεται στα σαμάρια και στα αιλάκια η δοσολογία μειώνεται ανάλογα με την ψεκαζόμενη επιφάνεια. **Δόση:** 46 κ. εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-50 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1.

• ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ:

Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια. Πριν το φύτευμα της καλλιέργειας. **Δόση:** 60-90 κ. εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-50 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1.

• ΣΟΓΙΑ:

Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια. **ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΑ:** Αμέσως μετά τη σπορά. **Δόση:** 35 κ. εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-50 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1.

• ΠΑΤΑΤΕΣ:

Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια.

A. ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΑ: Εφαρμογή από το φύτεμα μέχρι 3-4 ημέρες πριν το φύτευμα της καλλιέργειας. **Δόση:** 75-90 κ. εκ. σκευάσματος/στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-50 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1 ή

B. ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΑ: Εφαρμογή από την εμφάνιση των νεαρών βλαστών πατάτας έως το διάστημα που τα φυτά θα αποκτήσουν ύψος 5-10 εκ. **Δόση:** 45-60 κ. εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-50 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1 ή

Γ. ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΑ + ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΑ: 1η εφαρμογή λίγο πριν το φύτευμα της πατάτας και 2η εφαρμογή όταν τα φυτά αποκτήσουν ύψος 5-10 εκ. **Δόση:** 60+30 κ. εκ. σκευάσματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 40-50 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Οι δόσεις είναι ανάλογες με το είδος του εδάφους. Οι χαμηλές δόσεις στα ελαφρά εδάφη και οι υψηλές δόσεις στα βαριά εδάφη.

2. Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti*), Αναγαλλίδα (*Anagallis arvensis*), Ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*), Βλήττα (*Amaranthus* spp., *Amaranthus lividus*, *Amaranthus bouchonii*), Πλαγιαστό βλήτο (*Amaranthus blitoides*), Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Άγριο γογγύλι (*Brassica napus*), Καφέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*, *Chenopodium rubrum*), Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*), Άγρια ρόκα (*Diplotaxis*

erucoides), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-gallis*), Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*), Μεγάλη κολλητσιδα (*Gallium aparine*), Αγριοβίβος (*Hibiscus trionum*), Πορφυρό λάμιο (*Lamium purpureum*), Λινάρια (*Linaria vulgaris*), Ήρα (*Lolium* spp.), Καπνόχορτο (*Matricaria* spp.), Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*, *Matricaria recutita*), Μελίλωτος (*Melilotus indica*), Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua*), Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), Χοιροβότανο (*Picris echinoides*), Κοινή πίοα (*Roa annua*), Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*), Πολύγωνο αναρριχώμενο (*Polygonum convolvulus*), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*), Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*, *Senecio jacobaea*, *Senecio gallicus*), Σιληνή (*Silene spec.*), Αγριοσινάπι (*Sinapis arvensis*), Σισύμπριο (*Sisymbrium irio*), Πολυετής ζωχός (*Sonchus arvensis*), Ζωχός (*Sonchus oleraceus*), Στελλάρια (*Stellaria media*, *Stellaria* sp.), Μικρή τσουκνίδα (*Urtica urens*), Βερονίκη (*Veronica persica*, *Veronica arvensis*), Κοινός αγριοπανσές (*Viola arvensis*, *Viola* spp.), Ασπράγκαθο (*Xanthium spinosum*).

3. Η εφαρμογή του σκευάσματος στην ΠΑΤΑΤΑ (προφυτρωτικά ή/και μεταφυτρωτικά) συιστάται στις ποικιλίες: *Monalisa*, *Agria*, *Spunta*, *Asterix*, *Desirec*, *Baraka*, *Marfona*, *Ksw1*, *Ramos*, *Crisper*, *Nicolas*, *Kardan*, *Inovator*, *Charlotte*, *Europa*, *Fabula*, *Kapta*, *Exquisa*, *Kaptah Vendel*.

Στις ποικιλίες ΠΑΤΑΤΑΣ *Jaerla*, *Kennebeck*, *Hermes*, *Agata*, *Condor*, *Red Pondiac*, *Sirco*, *Goudmandine* συιστάται μόνο η προφυτρωτική εφαρμογή με τη χαμηλή δόση 75 κ.εκ./στρέμμα.

4. Η εφαρμογή του σκευάσματος στην TOMATA (προφυτρωτικά-μεταφυτρωτικά) συιστάται στις ποικιλίες: 9036, 9061, 3402, 20009, *Boludo*, *Talent*, *Durinta*, *Tomate De Ensalada*, *Peralta*, *Ps 1296*, *Ercole*, *Rio Grande* και *Titanio*.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Καρότο, Σπαράγγι, Σόγια: 60 ημέρες.

Τομάτα: 30 ημέρες

Πατάτα: Μη εφαρμόσιμο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ

Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

- Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση.
- Κατά τους θερινούς μήνες αποφεύγετε να ψεκάζετε τις ζεστές ώρες της ημέρας.
- Για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας, να χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα διαφορετικών χημικών ομάδων, με διαφορετικούς τρόπους δράσης στα ίδια χωράφια, στα τιλαίσια αμειψισποράς.
- Αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες καλλιέργειες και ειδικότερα σε καλλιέργειες τεύπων και παντζαριών που απέχουν λιγότερο από 1 μέτρο από την ψεκαζόμενη καλλιέργεια.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, να ΜΗΝ σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες μετά την εφαρμογή του Sencor 600 SC: ηλιάνθος, αραβόσποτος, σόργο, σόγια, σινάπι και φασόλια.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις ποικιλίες που αναφέρονται, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Αποφεύγετε το συνδυασμό του Sencor 600 SC με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, σε συνθήκες αποθήκευσης, στην αρχική του κλειστή συσκευασία.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ - ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

• Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην αναπνέετε εκνεφώματα. • Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Να φοράτε ανθεκτικά υποδήματα κατά την εφαρμογή. • Εάν οι εργάτες εισέρθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή, να φοράνε γάντια και ανθεκτικά υποδήματα. • Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ασφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων για την καλλιέργεια της πατάτας και του σπαραγγιού για την προφυτρωτική εφαρμογή με την υψηλή δόση ή τη σπαστή εφαρμογή (προφυτρωτικά + μεταφυτρωτικά). • Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μια ασφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη για την καλλιέργεια της πατάτας και του σπαραγγιού για την προφυτρωτική εφαρμογή με την υψηλή δόση ή εναλλακτικά να χρησιμοποιείτε ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 50% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού. • Συμβουλευθείτε/Επισκευθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Πρώτες βοήθειες

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:

Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και τοποθετείστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.

• **Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.**

Εισπνοή: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

Επαφή με το δέρμα: Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.

Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια. Ζητήστε ιατρική συμβουλή, στην περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει και αναπτύσσεται.

Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

Συμβουλές για το γιατρό: Θεραπεία: Θεραπεία συμπτωματική. Σε περίπτωση κατάποσης η πλύση στομάχου πρέπει να ακολουθείται στις 2 πρώτες ώρες μόνο εφόσον έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα. Παρ'όλ'αυτά, η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικού νατρίου συνιστάται πάντα.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 7793777.

Γραμμή **έκτακτης ανάγκης** Bayer

24/7

από σταθερό: **800 1135 353**

από κινητό: **210 6166 332**

Bayer

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι

Τηλ.: 210 6166000

Fax: 210 6109100

www.bayercropscience.gr

GR80518390A





sencor[®]
600 SC

100 ml e

Αρ. Άδειας Διάθεσης
στην Αγορά Υ.Π.Α.Π.Ε.:
70115/3-3-2015

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Εγγ. σύνθεση: metribuzin 60% β/ο, Βοηθ. ουσίες: 43,9% β/β

Ζιζανιοκτόνο

για την καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε καλλιέργειες πατάτας, τομάτας, σόγιας, καρότου και σπαραγγιού.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι.

Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

ΠΡΟΣΟΧΗ

