

L1010022 GREC/5T PPE4052383



syngenta®

Azoxystrobin (αζοξυστρομπίν)

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Αρ. Οριστ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ.

Γεωργ.: 6735/10-4-2002

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Azoxystrobin 25% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 76,2% β/β

Προστατευτικό

μυκητοκτόνο που

ελέγχει μύκητες

που ανήκουν

στους Ασκομύκητες,

Βασιδιομύκητες,

Δευτερομύκητες

και Ωομύκητες.



Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

375 ml e

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:

Syngenta Hellas A.E.B.E. , 153 49 Ανθούσα, Τηλ.: 210 6666612-13

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

www.syngenta.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ



- **Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • «Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση και τον ψεκασμό».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:

Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον παθόντα από τον χώρο που εκτέθηκε και κρατήστε τον να αναπνεύσει σε ζεστό χώρο. Ενημερώστε τον γιατρό προληπτικά.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί και ξεπλύνετε τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε αμέσως συμβουλή γιατρού και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα. Εάν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του ξεπλύνετε του το στόμα με νερό. Μην του προκαλέσετε εμετό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡ. ΔΗΛΗΤΗΡ.: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας
20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

**Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Προστατευτικό μυκητοκτόνο με μερική διεγασματική δράση που παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων. Ελέγχει μύκητες που ανήκουν στους Ασκομύκητες, Βασιδιομύκητες, Δευτερομύκητες και Ωομύκητες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως με προσοχή να διαβραχούν καλά όλες οι επιφάνειες που κινδυνεύουν από περονόσπορο και ωίδιο. Χρησιμοποιείτε λίγο νερό για τον ψεκασμό (μέχρι 120 λίτρα ανά στρέμμα και η ανάλογη ποσότητα νερού θα εξαρτάται από το μέγεθος της βλάστησης).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε αναδεύοντας την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε το δοχείο με το υπόλοιπο νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. Τα κενά συσκευασίας ξεπλύντε τα πολλές φορές ρίχνοντας το νερό στο ψεκαστικό.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Αμπέλι:

• Για το Ωίδιο (*Uncinula necator*) 50-75 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-120 λίτρα/στρέμμα. Προληπτικές εφαρμογές κυρίως από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων.

• Για τον Περονόσπορο (*Plasmopara viticola*) 75-100 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-120 λίτρα/στρέμμα. Προληπτικές εφαρμογές από την εμφάνιση των ταξιανθιών και εφόσον υπάρξει ένδειξη προσβολής περνοσπόρου ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

Φιστικιά (καλλιέργεια ήσσονος σημασίας)¹:

Για Βοτρυοσφαίρια (*Botryosphaeria dothidea*) 90 κ.εκ. /στρέμμα (max) με όγκο ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων ή εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της ασθένειας.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Αμπέλι: Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-12 ημέρες.

Να γίνεται μία εφαρμογή με *Quadris* κάθε 3.

Φιστικιά: Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14-21 ημερών.

Παρατηρήσεις:

1. Όταν ο κίνδυνος προσβολής ωιδίου είναι μικρός έως μέτριος να χρησιμοποιείται η μικρή δόση (50 κ.εκ. σκ./hl), με μεσοδιάστημα 12 ημέρες ενώ όταν είναι μεγάλος η ίδια δόση ανά δεκαήμερο. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένου κινδύνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μεγάλη δόση (75 κ.εκ. σκ./hl).
2. Για το ωίδιο εφαρμογή του *QUADRIS* σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα επαφής (θείο, pyrazophos ή dinocap) ή διασυστηματικά με διαφορετικό τρόπο δράσης π.χ. *DMI's*.
3. Όταν ο κίνδυνος προσβολής περονόσπορου είναι μικρός έως μέτριος να εφαρμόζεται η μικρή δόση (75 κ.εκ. σκ./hl) με μεσοδιάστημα 12 ημερών. Στην περίπτωση υψηλού κινδύνου να χρησιμοποιείται μεσοδιάστημα 10 ημερών και σε ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ασθένεια συνθήκες (επιδημία) να χρησιμοποιείται η μεγάλη δόση (100 κ.εκ. σκ./hl).
4. Για τον περονόσπορο εφαρμογή του *QUADRIS* σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα επαφής ή μυκητοκτόνα διασυστηματικά με διαφορετικό τρόπο δράσης.

¹ Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στη καλλιέργεια της φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

Περιορισμοί στην χρήση:

- Αποφυγή θεραπευτικών επεμβάσεων.
- Να μην εφαρμόζεται σε φυτώρια αμπελιού.

Φυτοτοξικότητα:

Μπορεί να παρατηρηθεί σε μερικές ποικιλίες ένα ελαφρό, διάχυτο κιτρίνισμα των φύλλων που βρίσκονται στο στάδιο της γρήγορης ανάπτυξης. Το σύμπτωμα αυτό, που παρατηρείται και φυσιολογικά είναι καμία φορά πιο έντονο μετά από ψεκασμό με QUADRIS. Κρατάει λίγες ημέρες (περίπου μία εβδομάδα) και υποχωρεί μετά, χωρίς καμία συνέπεια για το αμπέλι. Δεν συντρέχει λόγος για να ληφθούν μέτρα αν παρουσιαστεί αυτό το σύμπτωμα (π.χ. διαφυλλική λίπανση κλπ.).

- Το QUADRIS είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην χρησιμοποιείται το QUADRIS για εφαρμογές στις μηλιές.
- Μην χρησιμοποιείτε για ψεκασμό μηλιάς, ψεκαστικά μέσα που έχουν χρησιμοποιηθεί με QUADRIS.
- Μην χρησιμοποιείτε το QUADRIS εάν υπάρχει πιθανότητα να φτάσει το ψεκαστικό νέφος σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αμπέλι: 21 ημέρες., Φιστικιά: 21 ημέρες

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία χωρίς να ανοιχθεί, υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Πλύσιμο των ψεκαστικών μέσων: Πρέπει να γίνεται σε αψέκαστη περιοχή του αμπελιώνα όπου χρησιμοποιήθηκε το QUADRIS ή σε ειδικό χώρο για πλύσιμο με τσιμεντένιο δάπεδο και συλλογή των εκπλυμάτων σε ειδική δεξαμενή. Το πλύσιμο γίνεται με 3 ξεπλύματα του βυτίου και των μερών του ψεκαστήρα με νερό. (Το QUADRIS είναι φυτοτοξικό στη μηλιά, να μην χρησιμοποιούνται για ψεκασμό μηλιάς ψεκαστικά μέσα που έχουν προηγουμένως εφαρμόσει το QUADRIS 25 SC, βλέπε φυτοτοξικότητα).

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Το προσωπικό που θα ασχοληθεί για τον καθαρισμό σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει να φοράει κατάλληλα προστατευτικά ρούχα, δηλαδή, αδιάβροχο, γάντια που να αντέχουν σε χημικά, μπότες και κάλυμμα για τα μάτια. Το χυμένο QUADRIS θα πρέπει να απορροφηθεί σε άμμο, χώμα ή άλλο διαθέσιμο απορροφητικό υλικό.

Στη συνέχεια απομακρύνεται το απορροφητικό υλικό με το QUADRIS σε δοχεία και ξεπλένεται με νερό ο χώρος, λαμβάνοντας πρόνοια για την αποφυγή μόλυνσης του δικτύου στράγγισης ή άλλων επιφανειακών νερών.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Να γίνεται μία εφαρμογή με QUADRIS κάθε 3. Μετά τον ψεκασμό με QUADRIS να ακολουθούν επεμβάσεις με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. Για παράδειγμα εναλλαγή του QUADRIS με τα μυκητοκτόνα που έχουν ως δρών συστατικό το *kresoxim methyl* ή *famoxadone*, δεν επιτρέπεται.



