

To GROWER 0-29-26 είναι ένα υπερ-συμπυκνωμένο λίπασμα PK (Φωσφορού-Καλίου) που περιέχει φωσφορικές ενώσεις καλίου. **To GROWER 0-29-26** είναι διαγεγός διάλιμα πλήρης διαδιλτό στο νερό το οποίο απορροφάται αμέσως από τους φυτικούς ιστούς των φύλλων και της ρίζας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το συμπυκνωμένο λίπασμα **GROWER 0-29-26** δρά στη ρέψη των φυτών με τους ακολουθούς τρόπους:

- Απορροφάται πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τα φωσφορικά πιάταμάτα καλύπτοντας πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες φωσφορού και καλίου.
- Αποδειχθείει σταδιακά τον φωσφορό κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων ανάπτυξης της καλλιέργειας.
- Προέρχεται την ανάπτυξη του φυτού και της ρίζας.
- Συνεισφέρει στην επίτευξη αυητών αποδόσεων και βελτιωμένης ποιοτήτας καρπού.
- Βελτιώνει τη φυσική κατάσταση του φυτού.
- Αυξάνει την ικανότητα των φυτών να ανθίστανται σε δύσμενες συνθήκες που προκαλούνται από περιβαλλοντικούς και άλλους παράγοντες.
- Είναι φιλικό προς το περιβάλλον (λιγότερο τοξικό για το περιβάλλον από ότι η αστιρίνη).

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΝ συνδυάζεται με χαλκούχα σκευάσματα. Πριν την ανάμηξη στο βιτό να γίνεται πάντα ένα τετρανικό συνδυαστικότητας. Συστήνεται η χρησιμοποίηση όλου του διαλύματος της δεξαμενής μέσα σε μια μέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Εφαρμόστε όταν υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες υγρασίας ατμόσφαιρας και εδάφους καθώς και μέτεως θερμοκρασίες.
- Πρέπει να εφαρμόζεται αραιώμενο σε ικανή ποσότητα νερού που να επιτρέπει καλή καλλιέργεια.
- Ακαλούθηστε τις οδηγίες εφαρμογής που αναγράφονται στην επικετή οποιουδήποτε φωτοφαρμάκου συνδυάστε με **to GROWER 0-29-26**.
- Μην εφαρμόζετε όταν η καλλιέργεια βρίσκεται κάτω από συνθήκες έντονου στρες από έντονα, ζέστη ή χαμηλή επιτήδεια υγρασίας.
- Μην εφαρμόζετε κατά τη διάρκεια των ζεστών ωρών της ημέρας.
- Μην εφαρμόζετε συμπυκνωμένο διάλιμα πάνω στα φύλλα ή στους καρπούς.

ΥΓΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

GROWER

0 - 29 - 26

ΣΥΝΘΕΣΗ

P_2O_5 υδατοδιαλυτό 29% β/β
 K_2O υδατοδιαλυτό 26% β/β

100% Φωσφορική ένωση
Καλίου



HUMOFERT



ΕΡΜΟΥ 1 & ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ
144 52, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210 284 5891 - FAX. 210 281 7971
E-mail: info@humofert.gr

4 lt

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Ημέρα προστίτης εφαρμοστεί διαφυλλικά ή με υδροποτούς σε ακόλουθες δοσολογίες και χρήσης εφαρμογής:

Καρπούτικα, Λαχανικά (τούρτα, πιτσέλα, αγγούρι, πεπόνι, καρπούτικα, μαρούλι, σπανάκι, μπρόκολο, φασόλια, αρακάς): 0,2-0,5 lt. Η ανά στρέμμα.

Επιδομή: 10-15 μέτρες μετα την εφαρμογή.

Ζητεμογονή: 10-15 μέτρες μετα την εφαρμογή. Μπορεί να γίνουν επιπλέον εφαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας.

Φράουλα: 0,2-0,5 lt Ανά στρέμμα. Η εφαρμογή Μετά την μεταρρύθμιση στο στόμιο του πραγματού φύλλου. Η ανά στρέμμα. Η εφαρμογή μετα την μεταρρύθμιση στο στόμιο του πραγματού φύλλου. Η εφαρμογή 30 μέτρες μετα την εφαρμογή. Μπορεί να γίνουν επιπλέον εφαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας.

Πατάτα, Κρεμμύδι και άλλες μούριδες, βαθύδασης και καρπούδες καλλιέργειες: 0,2-0,5 lt Ανά στρέμμα. Η εφαρμογή Μετά την μεταρρύθμιση, την αράσιωση ή στο στόμιο του πραγματού φύλλου. Η εφαρμογή 30 μέτρες μετα την εφαρμογή. Κάθε 30 μέτρες μέχρι να γίνεται η μήτρα ή συμφέρει με τις ανάγκες της καλλιέργειας.

Αμαράντικο, Νεκταρίνιο, Ραδικόνι: 0,2-0,5 lt Ανά στρέμμα. Η εφαρμογή Στην πράσινη κορώνα της καλλιέργειας ή στην στρογγυλή της καλλιέργειας.

Μήλο, Αράκι, Καρύδια: 0,2-0,5 lt Ανά στρέμμα. Η εφαρμογή Στην πράσινη κορώνα και στην επιπλέον εφαρμογής. Κάθε 30 μέτρες μέχρι την εφαρμογή. Κάθε 30 μέτρες μέχρι την εφαρμογή. Η εφαρμογή μετα την μεταρρύθμιση της καλλιέργειας.

Ακτινίδιο: 0,2-0,5 lt Ανά στρέμμα. Η εφαρμογή Πριν την ανθοφορία. Η ανά στρέμμα. Η εφαρμογή Πριν την ανθοφορία. Η ανά στρέμμα. Η εφαρμογή Στην πράσινη κορώνα και στην επιπλέον εφαρμογής. Κάθε 30 μέτρες μέχρι την εφαρμογή. Κάθε 30 μέτρες μέχρι την εφαρμογή. Η εφαρμογή μετα την μεταρρύθμιση της καλλιέργειας.

Εδέμος, Καρπούζι: 0,2-0,5 lt Ανά στρέμμα. Η εφαρμογή Πριν την ανθοφορία. Η ανά στρέμμα. Η εφαρμογή Στην πράσινη κορώνα και στην επιπλέον εφαρμογής. Πριν τη μεγένεση, στο γύναικο και 2-3 εβδομάδες πριν την εφαρμογή Η εφαρμογή μετα την μεταρρύθμιση της καλλιέργειας.

Κρεμμύδια: 0,2-0,5 lt Ανά στρέμμα. Η εφαρμογή Πριν την ανθοφορία. Η ανά στρέμμα. Η εφαρμογή Στην πράσινη κορώνα και στην επιπλέον εφαρμογής. Πριν τη μεγένεση, στο γύναικο και 2-3 εβδομάδες πριν την εφαρμογή Η εφαρμογή μετα την μεταρρύθμιση της καλλιέργειας.

Κρεμμύδια στραγγισμένα: 0,2-0,5 lt Ανά στρέμμα. Η εφαρμογή Πριν την ανθοφορία. Η ανά στρέμμα. Η εφαρμογή Στην πράσινη κορώνα και στην επιπλέον εφαρμογής. Πριν τη μεγένεση, στο γύναικο και 2-3 εβδομάδες πριν την εφαρμογή Η εφαρμογή μετα την μεταρρύθμιση της καλλιέργειας.

Σταρόπιτικο, Κρέπα: 0,2-0,5 lt Ανά στρέμμα. Η εφαρμογή Στην πράσινη κορώνα και στην επιπλέον εφαρμογής. Πριν τη μεγένεση, στο γύναικο και 2-3 εβδομάδες πριν την εφαρμογή Η εφαρμογή μετα την μεταρρύθμιση της καλλιέργειας.

Σπρέντερ: 0,2-0,5 lt Ανά στρέμμα. Η εφαρμογή Στην πράσινη κορώνα και στην επιπλέον εφαρμογής. Πριν τη μεγένεση, στο γύναικο και 2-3 εβδομάδες πριν την εφαρμογή Η εφαρμογή μετα την μεταρρύθμιση της καλλιέργειας.

Επιπλέον εφαρμογή: Το πρώτο έτος πολλή άριστη. Επιπλέον εφαρμογής μετα την εφαρμογή της καλλιέργειας. Απορρίπτεται την επιτροπή με το δέσμωμα και τα μάτια. Πλένετε τον καλό καθέ της καλλιέργειας.

Επιπλέον εφαρμογή: Το πρώτο έτος πολλή άριστη. Επιπλέον εφαρμογής μετα την εφαρμογή της καλλιέργειας. Απορρίπτεται την επιτροπή με το δέσμωμα και τα μάτια. Πλένετε τον καλό καθέ της καλλιέργειας.

Επιπλέον εφαρμογή: Το πρώτο έτος πολλή άριστη. Διατηρείται το δέσμωμα μετα την εφαρμογή της καλλιέργειας. Απορρίπτεται την επιτροπή με το δέσμωμα και τα μάτια. Πλένετε τον καλό καθέ της καλλιέργειας.

Επιπλέον εφαρμογή: Το πρώτο έτος πολλή άριστη. Διατηρείται το δέσμωμα μετα την εφαρμογή της καλλιέργειας. Απορρίπτεται την επιτροπή με το δέσμωμα και τα μάτια. Πλένετε τον καλό καθέ της καλλιέργειας.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΗ ΕΛΑΦΡΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ