

Τεχνολογία (Πενερτζέτικ) **penergetic**

Μοναδική Τεχνολογία

με την οποία μεταφέρονται συγκεκριμένες πληροφορίες μέσω της ενεργοποίησης συχνοτήτων χαμηλού φάσματος στο υλικό φορέα.

Εφαρμοζόμενα στο έδαφος ή το φυτό εκπέμπουν βιο-ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες με αποτέλεσμα:



- **Να διεγείρεται και να προωθείται η βιολογική δραστηριότητα στο έδαφος**

- **Να ενεργοποιείται το φυτό και να βελτιώνεται η φωτοσυνθετική του ικανότητα και η απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων.**

penergetic b Εδαφοβελτιωτική ουσία

- + Ευνοεί την ανάπτυξη των ωφέλιμων μικροοργανισμών του εδάφους.
- + Ενεργοποιεί τις μυκόρριζες.
- + Ευνοεί την αποσύνθεση των υπολειμμάτων της καλλιέργειας.
- + Αυξάνει την υδατοϊκανότητα του εδάφους.
- + Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους των εδαφών.

Το **penergetic b** βελτιώνει τη δομή, τη γονιμότητα και την αειφορία των εδαφών, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί τη μεταβολική δραστηριότητα στο έδαφος.

Δοσολογία: 30-50 γραμ./στρέμμα / εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Προτείνονται 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο, η πρώτη πριν τη φύτευση (τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη σπορά) ή την έναρξη της βλάστησης και η δεύτερη μετά τη συγκομιδή.

penergetic p Βοηθητική ουσία της ανάπτυξης των φυτών

- + Βελτιώνει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων.
- + Αυξάνει την αποτελεσματικότητα των χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων.
- + Προωθεί την ανάπτυξη των φυτών.
- + Βελτιώνει τις φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών π.χ. φωτοσύνθεση, επίπεδο χλωροφύλλης κ.α.
- + Αυξάνει την παραγωγή.

Το **penergetic p** επιδρά διεγερτικά στη μικροβιολογία της περιοχής του ριζικού συστήματος και προωθεί τη φυσική αφομοίωση θρεπτικών συστατικών από το φυτό.

Δοσολογία: 20-25 γραμ./στρέμμα/εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Προτείνονται 4-5 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.

Τρόπος εφαρμογής των **penergetic**

Τα **penergetic** αναμιγνύονται με νερό ώστε να σχηματιστεί ένα ομοιόμορφο διάλυμα το οποίο εφαρμόζεται είτε με ψεκασμό είτε με το νερό άρδευσης (drip ή sprinkler). Είναι κατάλληλα για όλες τις καλλιέργειες

- + Τα σκευάσματα **penergetic b** και **penergetic p** μπορούν να εφαρμοστούν σε συνδυασμό με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, υγρά ή στερεά λιπάσματα.
- + Να μην χρησιμοποιείται το **penergetic b** ταυτόχρονα με το σκεύασμα **penergetic p** (απαιτείται να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον 10 ημερών μεταξύ των εφαρμογών των δύο προϊόντων).



Η Τεχνολογία **penergetic**

+ **Επιταχύνει** τη δραστηριότητα των ωφέλιμων μικροοργανισμών του εδάφους π.χ. μυκόρριζες

+ **Περιορίζει** τη συμπίεση του εδάφους και βελτιώνει τη δομή του.

Επιταχύνει την αποσύνθεση των υπολειμμάτων της καλλιέργειας

+ **Προωθεί** την ανάπτυξη υγιούς ρίζας & την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων

+ **Αυξάνει** τη φωτοσύνθεση και τα επίπεδα της χλωροφύλλης

Πρόγραμμα *penergetic b* και *penergetic p* ανά καλλιέργεια

Κηπευτικά (τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, αγγούρι, κολοκύθι, καρπούζι, πεπόνι κ.α.) **υπαίθρου και θερμοκηπίου.**

Πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση, εφαρμογή στο έδαφος 40 γραμ./στρέμμα *penergetic b*. Στη συνέχεια ανά 15 με 20 ημέρες ψεκασμός των φυτών με 25 γραμ./στρέμμα *penergetic p*. Μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής ψεκασμός του εδάφους με 40 γραμ./στρέμμα *penergetic b*.

Φυλλώδη Λαχανικά (Λάχανο, μαρούλι κ.α.).

Πριν τη μεταφύτευση εφαρμογή στο έδαφος 40 γραμ./στρέμμα *penergetic b*. Στη συνέχεια 15 ημέρες μετά την μεταφύτευση, κατά την ανάπτυξη των φυτών και πριν το σχηματισμό της κεφαλής, ψεκασμός με 25 γραμ./στρέμμα ανά εφαρμογή *penergetic p*. Μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής ψεκασμός του εδάφους με 40 γραμ./στρέμμα *penergetic b*.

Βολβώδη Λαχανικά (κρεμμύδι, κάρωτο κ.α.).

Πριν τη σπορά εφαρμογή στο έδαφος 40 γραμ./στρέμμα *penergetic b*. Στη συνέχεια στα στάδια του φυτρώματος, στα 4 φύλλα, στα 6 φύλλα και στα 8-10 φύλλα εφαρμογή 25 γραμ./στρέμμα *penergetic p* ανά εφαρμογή. Μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής ψεκασμός του εδάφους με 40 γραμ./στρέμμα *penergetic b*.

Πατάτα

Πριν τη σπορά εφαρμογή στο έδαφος με 40 γραμ./στρέμμα *penergetic b*. Στη συνέχεια από το φύτευμα έως τη συγκομιδή ανά 15 με 20 ημέρες ψεκασμός των φυτών με 25 γραμ./στρέμμα *penergetic p* ανά εφαρμογή. Μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής ψεκασμός του εδάφους με 40 γραμ./στρέμμα *penergetic b*.

Φράουλα

Μετά τη δημιουργία των σαμαριών και πριν τη μεταφύτευση των μοσχευμάτων ή των φυτών, εφαρμογή 40 γραμ./στρέμμα *penergetic b*. Μετά τη μεταφύτευση εφαρμογή 25 γραμ./στρέμμα *penergetic p*. Κατά την ανάπτυξη του φυλλώματος, στην καρπόδεση και κατά την ανάπτυξη του καρπού, ψεκασμός των φυτών με 25 γραμ./στρέμμα *penergetic p* ανά εφαρμογή. Μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής ψεκασμός του εδάφους με 40 γραμ./στρέμμα *penergetic b*.

Δενδρώδεις καλλιέργειες (πυρηνόκαρπα, μπλοειδή, εσπεριδοειδή, ακρόδρυα, ελιά κ.α.) καθώς και **Ακτινίδιο, Σταφύλι**

Πριν την έκπτυξη των οφθαλμών εφαρμογή στο έδαφος 40 γραμ./στρέμμα *penergetic b*. Στη συνέχεια κατά την έναρξη της άνθησης και κατά την πτώση των πετάλων ψεκασμός των δένδρων με 25 γραμ./στρέμμα *penergetic p*. Κατά την ανάπτυξη των καρπών εφαρμογή 25 γραμ./στρέμμα *penergetic p*. Μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής ψεκασμός του εδάφους με 40 γραμ./στρέμμα *penergetic b*.

Σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτος κ.α.)

Πριν τη σπορά, εφαρμογή στο έδαφος 40 γραμ./στρέμμα *penergetic b*. Στη συνέχεια την Άνοιξη 1 έως 2 εφαρμογές με ψεκασμό των φυτών με 25 γραμ./στρέμμα *penergetic p* ανά εφαρμογή. Μετά τη συγκομιδή ψεκασμός του εδάφους με 40 γραμ./στρέμμα *penergetic b*.

Ρύζι

Μετά την προετοιμασία του χωραφιού και πριν τη σπορά εφαρμογή στο έδαφος 40 γραμ./στρέμμα *penergetic b*. Στη συνέχεια 30 ημέρες μετά τη σπορά και 60 ημέρες μετά τη σπορά, ψεκασμός των φυτών με 25 γραμ./στρέμμα *penergetic p* ανά εφαρμογή. Μετά τη συγκομιδή ψεκασμός του εδάφους με 40 γραμ./στρέμμα *penergetic b*.

Καπνός

Πριν τη μεταφύτευση εφαρμογή στο έδαφος 40 γραμ./στρέμμα *penergetic b*. Στη συνέχεια ανά 20 με 30 ημέρες ψεκασμός των φυτών με 25 γραμ./στρέμμα *penergetic p* ανά εφαρμογή. Μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής ψεκασμός του εδάφους με 40 γραμ./στρέμμα *penergetic b*.

Βαμβάκι

Μετά την προετοιμασία του χωραφιού και πριν τη σπορά εφαρμογή στο έδαφος 40 γραμ./στρέμμα *penergetic b*. Στη συνέχεια στα 4 με 5 φύλλα, όταν τα φυτά έχουν ύψος 25 εκατ. και κατά την ανθοφορία ψεκασμός των φυτών με 25 γραμ./στρέμμα *penergetic p* ανά εφαρμογή. Μετά τη συγκομιδή ψεκασμός του εδάφους με 40 γραμ./στρέμμα *penergetic b*.

Όσπρια (φασόλι, φακή, ρεβύθι κ.α.)

Μετά την προετοιμασία του χωραφιού και πριν τη σπορά εφαρμογή στο έδαφος 40 γραμ./στρέμμα *Penergetic b*. Στη συνέχεια κατά την ανάπτυξη του φυλλώματος και στην έναρξη της ανθοφορίας ψεκασμός των φυτών με 25 γραμ./στρέμμα *penergetic p* ανά εφαρμογή. Μετά τη συγκομιδή ψεκασμός του εδάφους με 40 γραμ./στρέμμα *Penergetic b*.



Πρόγραμμα *renergetic p* & *renergetic b* για τη Μηδική

Η εφαρμογή των *renergetic p* και *renergetic b* στην καλλιέργεια της **μηδικής** προσφέρει:

- ⊕ **Ομοιόμορφο** φύτευμα και **μικρότερες απώλειες** φυτών ανά επιφάνεια (στις νέες φυτείες).
- ⊕ **Γρήγορη ανάπτυξη** των φυτών (μετά τον λήθαργο ή μετά από κοπή).
- ⊕ Μικρότερη απώλεια φυτών (αραίωμα) από χρονιά σε χρονιά.
- ⊕ **Αύξηση παραγωγής** (περισσότερα φυτά ανά επιφάνεια – πιο πυκνή φυτεία).
- ⊕ **Καλύτερη ανάπτυξη** των φυτών (φύλλα ανά βλαστό, χρωματισμός).
- ⊕ **Βελτίωση** της **δομής** του **εδάφους** (περιορισμός συμπίεσης, βελτίωση στράγγισης).
- ⊕ **Βελτίωση** της **ποιότητας** του σανού μηδικής (π.χ. πρωτεΐνη κ.α.).

Νέα φυτεία

Πριν ή μετά τη σπορά:

Εφαρμογή στο έδαφος με 40 γραμ./στρέμμα *renergetic b*.

Πριν την πρώτη κοπή:

Ψεκασμός των φυτών με 20 γραμ./στρέμμα *renergetic b*.

Μετά την πρώτη κοπή:

Ψεκασμός με 20 γραμ./στρέμμα *renergetic p*.

Επανάληψη του ψεκασμού μετά από κάθε (δεύτερη) κοπή.

Εγκατεστημένη φυτεία

Τέλος Χειμώνα με αρχές Άνοιξης:

Μετά τον λήθαργο εφαρμογή 40 γραμ./στρέμμα *renergetic b*.


Πριν την πρώτη κοπή:

Ψεκασμός των φυτών με 20 γραμ./στρέμμα *renergetic p*.

Μετά την πρώτη κοπή:

Ψεκασμός με 20 γραμ./στρέμμα *renergetic p*.

Επανάληψη του ψεκασμού μετά από κάθε (δεύτερη) κοπή.



2.000 - 05/2019

Να διαβάζετε πάντα την επικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.