

Βρέξη σκόνη (WP)

MANCOZEB

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 80WP

Εγγ.σύνθεση: Mancozeb (Μανκοζέμ) 80%β/β (ομάδα: διθειοκαρβαμικά), Βοηθ.ουσίες 5,9%β/β

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ του προϊόντος με αρ. έγκρισης κυκλοφορίας:60296

Ημερομηνία χορήγησης άδειας παράλληλης εισαγωγής:10/2/2011

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:500 γραμ.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - Μηλεσβή (μηλιά, αχλαδιά): Για φουζοκλάδιο εφαρμογές στα στάδια της πρόοσης, ρόδινης/λευκής κορμής, πτώσης πετάλων και 7-10 μέρες καρπώδη. Να ακολουθούνται οι συνθήκες των γεωργικών προειδοποιητικών ανότρωτα. Δόση εφαρμογής: 150-200 γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού (μέγιστο 200 γρ./ στρέμμα). Όγκος φεκατικού υγρού (λίτρα/ στρέμμα): 50-100. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιπ. περίοδο: 4 εφόσον απαιτείται. **Αμυγδαλιές (αμυγδαλιές και αμυγδαλιές):** Για περονόσπορο εφαρμογές στα αβλαστά έξινα μήνες περίπου 10 εκ. και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Να ακολουθούνται οι συνθήκες των γεωργικών προειδοποιησεων. Για εφαρμογή και μείωση σήση 1-3 αναδεδίαιτες εφαρμογές κατά την έκπτυξη των σπόρων, αμέσως μετά το σχηματισμό του του φύλλου, στο στάδιο των 2-3 φύλλων. Δόση εφαρμογής: 200 γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού (μέγιστο 200 γρ./ στρέμμα). Όγκος φεκατικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50-100. Μεγ. αριθ. εφαρ. ανά καλ. περίοδο: 4 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Κερμαίοι (ελιά), Σκάρβο (εσβία):** Για περονόσπορο εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Δόση εφαρμογής: 200-250 γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού (μέγιστο 250 γρ./ στρέμμα). Όγκος φεκατικού υγρού (λίτρα/στρ.): 40-100. Μεγ. αριθ. εφαρ. ανά καλ. περίοδο: 4 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Τριτάρι (υπαίθρου):** Για περονόσπορο εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων. Για σπασίωση και αλτερναρίαση εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθένειων. Δόση εφαρμογής: 200 γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού (μέγιστο 200 γρ./ στρέμμα). Όγκος φεκατικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50-100. Μεγ. αριθ. εφαρ. ανά καλ. περίοδο: 4 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Μελιτζάνα, ντομάτα (υπαίθρου):** Για αλτερναρίαση εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Δόση εφαρμογής: 200 γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού (μέγιστο 200 γρ./ στρέμμα). Όγκος φεκατικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50-100. Μεγ. αριθ. εφαρ. ανά καλ. περίοδο: 4 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Καλαμίνθησβή (πεπόνι, καρπούζι και καλαμπόκι - υπαίθρου):** Για κλοδοσπορίαση εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Δόση εφαρμογής: 200 γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού (μέγιστο 200 γρ./ στρέμμα). Όγκος φεκατικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50-100. Μεγ. αριθ. εφαρ. ανά καλ. περίοδο: 4 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Καλαμίνθησβή (πεπόνι, καρπούζι και καλαμπόκι - υπαίθρου):** Για κλοδοσπορίαση εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Δόση εφαρμογής: 200 γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού (μέγιστο 200 γρ./ στρέμμα). Όγκος φεκατικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50-100. Μεγ. αριθ. εφαρ. ανά καλ. περίοδο: 4 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Μαρούλι (υπαίθρου):** Για περονόσπορο εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Δόση εφαρμογής: 200 γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού (μέγιστο 200 γρ./ στρέμμα). Όγκος φεκατικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50-100. Μεγ. αριθ. εφαρ. ανά καλ. περίοδο: 4 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Πατάτα:** Για περονόσπορο και αλτερναρίαση εφαρμογές όταν τα άνθη έχουν ύψος περίπου 15-20 εκ., μετά από 7 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. Δόση εφαρμογής: 200 γρ./ στρέμμα. Όγκος φεκατικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50-100. Μεγ. αριθ. εφαρ. ανά καλ. περίοδο: 8 με μεσοδιάστημα 7 ημερες εφόσον απαιτείται. **Καρύδι:** Για αλτερναρίαση εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Δόση εφαρμογής: 200 γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού (μέγιστο 200 γρ./ στρέμμα). Όγκος φεκατικού υγρού (λίτρα/στρ.): 50-100. Μεγ. αριθ. εφαρ. ανά καλ. περίοδο: 4 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Παρατηρήσεις: •**Να μην χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμυγδαλοκάρλα σε περίπτωση χρήσης του MANCOZEB ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 80 WP** • Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας • Το έδαφος των δένδρων είναι ανάλογη της έντασης της προσβολής •Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιησεων να ακολουθούνται οι συνθήκες των γεωργικών προειδοποιησεων.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής φεκατικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του φεκατικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση, προσθέτουμε αναδεδίαιτες τη συνιστώμενη δόση του εκκινητήρα. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεδίαιτες ουνοχές. **Τρόπος δράσης:** Το mancozeb δρα παρεμπόδιζοντας το κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά σημεία. Δραστία ευρύ φάσμα δράσης.

Αναχώρηση ανθεκτικότητας: Το MANCOZEB ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 80 WP πρέπει να χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μικροτόκωνα με ελεγχόμενo τρόπο δράσης.

Φυτοτοxicότητα: Μπορεί να προκαλέσει σκασμόραση σε μηλιές "Golden Delicious". Είναι φυτοτοξικό στις ποικιλίες αχλαδιάς Βασιλάρια, Κόσια και Κρυσταλί. **Συνδυαστικότητα -**

Ελεγχόμενη σπέρση πριν τη συγκομιδή: Μηλιά, Αχλαδιά, Αμυγδαλιές (αμυγδαλιές και αμυγδαλιές), Κερμαίοι (ελιά), Σκάρβο (εσβία), Μαρούλι (υπαίθρου): 28 ημέρες, Τριτάρι, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Πεπόνι, Καρπούζι, Καλαμίνθη (υπαίθρου): 3 ημέρες, Πατάτα: 7 ημέρες, Καρύδι: 35 ημέρες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Το κενό υλικό συσκευασίας (σακούλες, σκόδια μαζί με τα κομμάτια) αφού καταστραφούν προηγούμενας με σκόνη, για τη διασφάλιση της με περαιτέρω χρήσης, ανακατεύονται καλά με μικρή ποσότητα νερού και απορρίπτονται και ανάστροφα ενόψει.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο προστατευμένο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: –Αυξάνεται κλειδαμμένο, μακριά από παιδιά. –Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. –Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/συγκορμώσεις σταγονιδίων / ανεμεριόματα. –Να φοράτε προστατευτικό κράνη/προστατευτικό ενδυμασία, αεραγωγός προστασίας για τα μάτια/προστασία. –Πλύνετε τα ρούχων μετά από κάθε χρήση. –Φορέτε κατάλληλο αναπνευστικό μέσο κατά την αναδιάρθρωση και κατάλληλες μέσες κατά την εφαρμογή. –Οι εργατοί θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εάν εισέλθουν στο παλίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό. **•Κατά την εφαρμογή σε επαφές, αναπνέετε ή χρήση τραπέζ με κλειστή καμπίνα. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

Πρώτες βοήθειες: **Αερίματα:** Γενικά: Μη χρησιμοποιείτε νερό και μην προσέχετε φυτό και ο άνθρωπος διατηρεί τις συνθήκες του ή παρανοήσεις σπασμούς. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με τα υγρά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξεπλύμα για αρκετά λεπτά ακόμα. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα αναπνευστικής ανεπάρκειας: Σε περίπτωση επίθεσης: Μην προσέχετε φυτό. Σπρίτζε φρέσκο ατμοσφαιρικό καθαίο από το δωμάτιο ή την σκηνή. Σε περίπτωση επίθεσης: μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό. **Για τον γιατρό:** Φροντίδα υποστηρικτική. Ταυτόχρονη έγχυση στο σκενέλιμα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί το mancozeb έχει δράση διουρητική.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7795777

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επικοινωνία ύδατο

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Για να προστατέψετε τους υδροβίους οργανισμούς να αφήσετε μιν. αφεακτική όλη προστασία. **5 μέτρων** από τα επικοινωνία ύδατα για τις καλλιεργές κρεμμυδιού, κάρπου, μαρούλιού σκόρδου και πατάτας. **10 μέτρων** για την καλλιέργεια του αμπιλαού και **30 μέτρων** για τις διαφόρους καλλιέργειες

Από: Παύλος - Καρ. Ρεπουτσάνης - Νο. Άδεις: Έλατε από το συσκευασίας



ΠΡΟΣΟΧΗ
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Πιρίξιες mancozeb.
Υποπίνα για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
Παλιό πακέτο για τους υδροβίους οργανισμούς

12/15