## UPPER LAYER FRONT SIDE

+225. mm

+130. mm

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Απευθυνθείτε στον παρασκευαστή ή προμηθευτή για την ανάκτηση ή την ανακύκλωση. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. «Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος». «Σε περίπτωση επανεισόδου, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας».
**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**
**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:** (210) 7793777.

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

**ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.**
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας.

- **25 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και το ακτινίδιο, στις πρώιμες εφαρμογές.
- **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και το ακτινίδιο, στις όψιμες εφαρμογές.
- **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις υπόλοιπες καλλιέργειες.

Για να προστατέψετε **τα αρθρόποδα μη στόχους** να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη, όταν το προϊόν εφαρμόζεται σε δόση μεγαλύτερη των 300 κ.εκ./ στρέμμα.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Να φυλάσσεται σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, χωρίς την επίδραση του άμεσου ηλιακού φωτός και ακραίων θερμοκρασιών. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

# Limocide

**Μικρογαλάκτωμα υδατικής βάσης (ΜΕ)**
Orange oil (Όραντζ όιλ)

**Εγγυημένη σύνθεση: Orange oil 5.67% (β/ο)**
**Βοηθητικές ουσίες: 94 % (β/β)**

Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο και μυκητοκτόνο επαφής με βάση εκχύλισμα του Aurantii dulcis

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

**Α.Α.Δ.Α.: 13025/26.03.2020**

**Περιεχόμενο: 1L**

**Κάτοχος της άδειας:**
VIVAGRO
TECHNOPOLE MONTESQUIEU
5 ALLÉE JACQUES LATRILLE
33650 MARTILLAC Γαλλία
Τηλ.: 33 (0)5 57 78 32 68

Vivagro
WWW.VIVAGRO.FR

- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:**
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, 15231,
Χαλάνδρι, Αττική
Τηλ.: 2130065000

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

LAB-LIMO-BO1-GR

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Το **Limocide** είναι εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο και μυκητοκτόνο επαφής. Η δ.ο «orange oil» είναι εκχύλισμα του Aurantii dulcis με κύριο συστατικό το d-limonene (μονοτερπένιο). Επιδρά στη διαπερατότητα του εξωσκελετού των εντόμων και των ακάρεων και των εξωτερικών μεμβρανών των μυκήτων.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:**
**ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ: Στόχος:** Ωίδιο. **Δόση:** 600 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από το φούσκωμα των οφθαλμών έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπφρουτ): Στόχος:** Κόκκινη ψώρα των εσπεριδοειδών, Μετκάλφα, Κηροπλάστης, Τζιτζικάκι (Empoasca vitis), Θρίπες. **Δόση:** 800 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **Στόχος:** Ακάρεα. **Δόση:** 600 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την ολοκλήρωση της άνθησης έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ: Στόχος:** Τζιτζικάκι (Μετκάλφα). **Δόση:** 800 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από όταν οι καρποί αποκτήσουν το 50% του τελικού τους μεγέθους έως την έναρξη της ωρίμανσης τους. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΑΜΠΕΛΙ: Στόχος:** Ωίδιο, Περονόσπορος. **Δόση:** 160 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 10-20 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου έως όταν οι ράγες αρχίσουν να ακουμπάνε μεταξύ τους. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **Στόχος:** Θρίπες **Δόση:** 160 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 10-20 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **Στόχος:** Ακάρεα. **Δόση:** 200 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 10-20 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/7. **ΤΟΜΑΤΑ (Υ), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ): Στόχος:** Θρίπες. **Δόση:** 400 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 10-50 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου του κύριου βλαστού έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΤΟΜΑΤΑ (Θ), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Θ): Στόχος:** Αλευρώδεις. **Δόση:** 200 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 10-50 λίτρα/στρ.

OPEN HERE

## UPPER LAYER FRONT SIDE VARNISH GLOSS

## UPPER LAYER BACK SIDE

**Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου του κύριου βλαστού έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΠΙΠΕΡΙΑ (Θ): Στόχος:** Αλευρώδεις. **Δόση:** 200 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 10-50 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου του κύριου βλαστού έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΑΓΓΟΥΡΙ (Θ): Στόχος:** Ωίδιο. **Δόση:** 800 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου του κύριου βλαστού έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **Στόχος:** Αλευρώδεις. **Δόση:** 400 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου του κύριου βλαστού έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΑΓΓΟΥΡΙ (Υ): Στόχος:** Θρίπες. **Δόση:** 800 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου του κύριου βλαστού έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ (Θ): Στόχος:** Ωίδιο. **Δόση:** 400 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-50 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου του κύριου βλαστού έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **Στόχος:** Αλευρώδεις. **Δόση:** 200 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-50 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου του κύριου βλαστού έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΠΕΠΟΝΙ (Θ): Στόχος:** Ωίδιο. **Δόση:** 800 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου του κύριου βλαστού έως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του καρπού. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **Στόχος:** Αλευρώδεις. **Δόση:** 200 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 10-50 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου του κύριου βλαστού έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΠΕΠΟΝΙ (Υ): Στόχος:** Θρίπες. **Δόση:** 800 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου του κύριου βλαστού έως πριν την έκπτυξη των ανθέων. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (Θ): Στόχος:** Ωίδιο. **Δόση:** 400 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-50 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου του κύριου βλαστού έως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του καρπού. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **Στόχος:** Αλευρώδεις. **Δόση:** 200 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 10-50 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου του κύριου βλαστού έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 3/7. **ΦΡΑΟΥΛΑ (Υ): Στόχος:** Ωίδιο. **Δόση:** 300 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-50 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **Στόχος:** Θρίπες. **Δόση:** 400 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-50 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΦΑΚΗ (Υ): Στόχος:** Θρίπες. **Δόση:** 400 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-50 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΜΑΡΟΥΛΙ (Υ+Θ), ΑΝΤΙΔΙ (Υ+Θ): Στόχος:** Ωίδιο. **Δόση:** 300 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-50 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου έως το τέλος της άνθησης. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΜΑΡΟΥΛΙ (Θ), ΑΝΤΙΔΙ (Θ): Στόχος:** Αλευρώδεις. **Δόση:** 200 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-50 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **Στόχος**: Περονόσπορος. **Δόση:** 300 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-50 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου έως το τέλος της άνθησης. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ (Θ): Στόχος:** Ωίδιο. **Δόση:** 180 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 10-30 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου έως το τέλος της άνθησης. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΛΥΚΟΤΡΙΒΟΛΟ (Υ+Θ): Στόχος:** Ωίδιο. **Δόση:** 300 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-50 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου έως το τέλος της άνθησης. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ (Υ+Θ): Στόχος:** Ωίδιο. **Δόση:** 300 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-50 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου έως το τέλος της άνθησης. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΛΑΧΑΝΟ (Υ): Στόχος:** Θρίπες. **Δόση:** 400 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 10-50 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΛΑΧΑΝΟ (Θ): Στόχος:** Αλευρώδεις. **Δόση:** 200 κ.εκ/στρ.**Όγκος ψεκ. υγρού:** 10-50 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ (Υ): Στόχος:** Λευκή σκωρίαση. **Δόση:** 200 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 10-40 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου έως το τέλος της άνθησης. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΠΡΑΣΟ (Υ): Στόχος:** Θρίπες. **Δόση:** 640 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-80 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την ανάπτυξη του 2ου φύλλου έως πριν την ανάπτυξη του ανθικού στελέχους. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Υ): Στόχος:** Θρίπες. **Δόση:** 320 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-40 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την ανάπτυξη του 2ου φύλλου έως πριν την ανάπτυξη του ανθικού στελέχους. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΚΑΡΟΤΟ (Θ): Στόχος:** Ωίδιο. **Δόση:** 240 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 10-40 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την ανάπτυξη του 2ου φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΡΑΠΑΝΑΚΙ (Θ): Στόχος:** Περονόσπορος. **Δόση:** 320 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-80 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την ανάπτυξη του 2ου φύλλου έως την πλήρη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ (Υ), ΣΜΕΟΥΡΟ (Υ), ΜΑΥΡΗ ΣΤΑΦΙΔΑ (Υ): Στόχος:** Ωίδιο. **Δόση:** 240 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 10-30 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την ανάπτυξη του 2ου φύλλου έως ότου οι καρποί αποκτήσουν το 70% του τελικού τους μεγέθους. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΚΑΠΝΟΣ: Στόχος:** Θρίπες. **Δόση:** 320 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 10-40 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την ανάπτυξη του 2ου φύλλου έως την έναρξη της ανάπτυξης των ταξιανθιών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **Στόχος:** Αλευρώδεις. **Δόση:** 200 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 10-50 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την ανάπτυξη του 2ου φύλλου έως την έναρξη της ανάπτυξης των ταξιανθιών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7.
**ΑΒΟΚΑΝΤΟ: Στόχος:** Αλευρώδεις, Ισέρια. **Δόση:** 80 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 10 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης έως την πλήρη ωρίμανση. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7.
**Στόχος:** Τίγρεις. **Δόση:** 100 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 5-10 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έναρξη της ανάπτυξης των καρπών έως την πλήρη ωρίμανση. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **Στόχος:** Θρίπες. **Δόση:** 80 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 5-10 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έναρξη της βλάστησης έως την έναρξη της ανάπτυξης των καρπών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7.

## UPPER LAYER BACK SIDE GLUE LESS

## BOTTOM LAYER

**ΜΠΑΝΑΝΑ: Στόχος:** Αλευρώδεις Ισέρια. **Δόση:** 200 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 10-25 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης έως την πλήρη ωρίμανση. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **Στόχος:** Θρίπες. **Δόση:** 200 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-25 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έναρξη της ανάπτυξης των καρπών έως την πλήρη ωρίμανση. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7.
**ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΗ: Στόχος:** Αλευρώδεις. **Δόση:** 800 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης έως την πλήρη ωρίμανση. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7.
**ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ (Θ): Στόχος:** Λευκή σκωρίαση. **Δόση:** 100 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έναρξη της βλάστησης έως την ολοκλήρωση της άνθησης. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 3/7.
**ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (Θ): Στόχος:** Ωίδιο. **Δόση:** 600 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έναρξη της βλάστησης έως την ολοκλήρωση της άνθησης. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **Στόχος:** Αλευρώδεις. **Δόση:** 400 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έναρξη της βλάστησης έως την ολοκλήρωση της άνθησης. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7.
**ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (Υ): Στόχος:** Θρίπες. **Δόση:** 800 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έναρξη της βλάστησης έως την ολοκλήρωση της άνθησης. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7.
**ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Θ): Στόχος:** Αλευρώδεις. **Δόση:** 400 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έναρξη της βλάστησης έως την πλήρη ωρίμανση. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **Στόχος:** Τζιτζικάκι. **Δόση:** 800 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έναρξη έως το τέλος της βλάστησης. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7.
**ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Υ): Στόχος:** Θρίπες. **Δόση:** 640 κ.εκ/στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-80 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής**: Από την έναρξη έως το τέλος της βλάστησης. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ.περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7.

**Παρατηρήσεις:**

- Κατά την εφαρμογή το σκεύασμα προτείνεται να συνδυάζεται με αντιαφριστικό.
- Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.
- Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος είναι μέτρια και διαφοροποιείται ανάλογα του εχθρού/ παθογόνου.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ**: Όταν χρησιμοποιούνται βομβίνοι για την επικονίαση οι κυψέλες θα πρέπει να παραμένουν κλειστές μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό. **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.
**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ**
Για όλες τις καλλιέργειες του φάσματος δράσης: 1 ημέρα. **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός της φυλλικής επιφάνειας. **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Ανακινείστε καλά τη συσκευασία πριν το άνοιγμά της. Γεμίστε το βυτίο με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε το νερό στο βυτίο αναδεύοντας συνεχώς. Ξεπλύνετε τη φιάλη 3 φορές και ρίξτε τα νερά στο βυτίο. Ψεκάστε το διάλυμα αμέσως μετά την προετοιμασία του.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:**
**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:** Όλα τα μέρη του ψεκαστικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανόμενων των ψεκαστήρων με βέργα χειροκίνητων ή μηχανοκίνητων) πρέπει να πλένονται σχολαστικά στο εξωτερικό και στο εσωτερικό τμήμα τους. Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό και απορρυπαντικό. Το νερό του ξεπλύματος να μη ρίχνεται σε ευαίσθητα τμήματα της καλλιέργειας ή σε έδαφος που προορίζεται για κάποια ευαίσθητη καλλιέργεια. Ξεπλύνετε τρεις φορές με καθαρό νερό.


# Limocide

**Μικρογαλάκτωμα υδατικής βάσης (ΜΕ)**
Orange oil (Όραντζ όιλ)

**Εγγυημένη σύνθεση: Orange oil 5.67% (β/ο)**
**Βοηθητικές ουσίες: 94 % (β/β)**

Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο και μυκητοκτόνο επαφής με βάση εκχύλισμα του Aurantii dulcis

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

**Α.Α.Δ.Α.: 13025/26.03.2020**

**Περιεχόμενο: 1L**

**Κάτοχος της άδειας:**
VIVAGRO
TECHNOPOLE MONTESQUIEU
5 ALLÉE JACQUES LATRILLE
33650 MARTILLAC Γαλλία
Τηλ.: 33 (0)5 57 78 32 68

Vivagro
WWW.VIVAGRO.FR

**Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:**
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, 15231,
Χαλάνδρι, Αττική
Τηλ.: 2130065000

**ΠΡΟΣΟΧΗ**


## BOTTOM LAYER RELEASE VARNISH

### Πληροφορίες Μακέτας / Job Info

DESIGN CODE

*20F13612-V1*

| | |
|---|---|
| DATE | 30/10/2020 |
| FILE'S NAME | 20F13612_V1.ap |
| PRINTING MATERIAL | PP WHITE |
| VARNISH | GLOSS |
| LAMINATION | NO |

### 'Εγκριση / Approval

○ Approved

Date:

Signed:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
*WHEN APPROVING THIS ARTWORK PLEASE MAKE SURE THAT THE BELOW POINTS ARE CHECKED*

- ○ Όλα τα κείμενα ή η αντιγραφή είναι σωστά, συμπεριλαμβανομένων ορθογραφία / *All text or copy is correct including spelling*
- ○ Διαχωρισμός χρωμάτων ή εμφάνιση είναι σωστή / *Colour separation or appearance is correct*
- ○ Αριθμός barcode είναι σωστός / *Barcode number is correct*
- ○ Τυχόν στοιχεία ή οι κωδικοί προϊόντος είναι σωστά / *Any item or product codes are correct*
- ○ Όλες οι δηλώσεις βάρους είναι σωστές / *All weight statements are correct*
- ○ Διευθύνσεις ή τα τηλέφωνα είναι σωστά / *Address or phone numbers are correct*
- ○ Όλες οι προειδοποιητικές δηλώσεις ή τα λογότυπα είναι σωστά / *All warning statements or logos are correct*

### Χρώματα Αρχείου / Used Separations

forlabels®


Παρακαλούμε στείλτε την έγκριση με e-mail ή με fax. Είναι δική σας ευθύνη ότι η μακέτα είναι σωστή, είτε λάβαμε το αρχείο από εσάς ή τη διαφημιστική σας είτε φτιάχτηκε από εμάς (εξ'ολοκλήρου ή με αλλαγές). Η FORLABELS δεν ευθύνεται για λάθη (λεκτικά, γραφικά) ή μικρές αλλαγές της αρχικής μακέτας από τη στιγμή που υπάρχει η έγκρισή σας. Οι μακέτες που έχουν φτιαχτεί αλλά δεν έχουν εγκριθεί θα αποθηκεύονται για 12 μήνες, μετά θα διαγράφονται.
*Please send your approval by e-mail or by fax. It is your responsibility that the model is correct, whether we received the file from you or your advertising agency or built by us (entirely or changes). FORLABELS is not responsible for any errors (grammar, graphical) or small changes of the original scale model from the moment it is authorizated. The models that have been made but not approved will be stored for 12 months, then deleted.*


DIECUT · Cyan · Magenta · Yellow · Black · PANTONE 567 C
Black REVERSE · GLUE LESS · RELEASE VARNISH · VARNISH GLOSS

### Σχόλια / Comments

ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ ΠΕΛΑΤΗ.
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ OUTLINES.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ.