

ACEPRID 20 SL

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Πυκνό Διάλυμα (SL)

ΑΣΕΤΑΜΙΠΡΙΔ (ΑΣΕΤΑΜΙΠΡΙΝΤ)

(χημική ομάδα: Νεονικοτινοειδή)

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: Ασεταμιπριδ 20% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 82,2% β/β

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Το ACEPRID 20SL κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά

βάσει της αρ. πρωτ. 4578/121540/07-05-2021

αδείας του Υ.Α.Α.Τ.

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως μυζητικών εντόμων καθώς και μασπτικών εντόμων σε πολλές καλλιέργειες.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ



Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως μυζητικών εντόμων καθώς και μασπτικών εντόμων σε πολλές καλλιέργειες. Το acetamiprid ανήκει στην ομάδα των νεονικοτινοειδών και δρα δεσμεύοντας τους μετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινούμε καλά το δοχείο/φιάλη πριν από τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σιγά σιγά με αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δύο -τρεις (2-3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται tripλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. Να μην γίνει επανείσοδος για 24 ώρες μετά την εφαρμογή της μεγάλης δόσης σε εσπεριδοειδή.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερ/νία παρασκευής του.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διάθεση περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Για εφαρμογή σε δέντρα και στο αμπέλι: "Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση. Για τη μεγάλη δόση στα εσπεριδοειδή τα γάντια πρέπει να φορεθούν και κατά την εφαρμογή".

Για εφαρμογή σε θερμοκήπιο: "Φοράτε κατάλληλα γάντια και αδιάβροχη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη / φόρτωση και κατά την εφαρμογή".

"Κατά την επανείσοδο να φοράτε φόρμα εργασίας και γάντια".

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό σε περίπτωση αδιαθεσίας. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσε-

τε από τα επιφανειακά ύδατα μία:

φυτική ζώνη ανάσχεσης 20μ για εφαρμογή σε **ντομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, μαρούλια, σκάρολα και λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf), φυτική ζώνη ανάσχεσης 10μ** για εφαρμογή σε **πατάτα, αμπέλι και ελαιοκράμβη.**

φυτική ζώνη ανάσχεσης 20μ ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%, σε βερικοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, μηλιά και ακλαδιά.**

φυτική ζώνη ανάσχεσης 15μ ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **50% σε δαμασκηνιά.**

αφέκαστη ζώνη 30μ ή αφέκαστη ζώνη 20μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **50%** ή **φυτική ζώνη ανάσχεσης 10μ** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **90%** σε **κερασιά.**

φυτική ζώνη ανάσχεσης 20μ ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **90%** σε **εσπεριδοειδή.**

αφέκαστη ζώνη 50μ με φυτική ζώνη ανάσχεσης 20μ ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 20μ με χρήση ακροφυσίων μεί-

σης της διασποράς κατά **75%, σε εσπεριδοειδή** (για εφαρμογή στη μεγάλη δόση).

φυτική ζώνη ανάσχεσης 20μ ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%, σε ελιά.**

Για να προστατέψετε τα **αρθρόποδα μη-στόχους** να αφήσετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργημένη γη:

10μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **90%, σε εσπεριδοειδή** (εφαρμογή νωρίς), **βερικοκιά, νεκταρινιά και ροδακινιά.**

10μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%** ή **5μ** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **90%, σε εσπεριδοειδή** (εφαρμογή αργά) και **κερασιά.**

10μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **50%** ή **5μ** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%, σε αμπέλι** (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο), **δαμασκηνιά, μηλιά και ακλαδιά.**

5μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **50%** σε **ντομάτα, πιπεριά και μελιτζάνα.**

15μ ή 10μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **50%** ή **5μ** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%** σε **ελιά.**


Παρασκευάζεται από:
Nufarm España, S.A.
Balmes, 200 08006 Βαρκελώνη | Τηλ.: 93 238 98 90



Κάτοχος αδείας - Υπεύθυνος τελικής διάθεσης στην αγορά - Συσκευασία - Διανομή:
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ
(Βοιωτία), 80ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας | Ύπατο Βοιωτίας, Δήμου Θηβαίων | info@karvelasavee.gr | www.karvelasavee.gr




ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ****ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ -ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γρέιπ φρουτ, Λάιμ, Κουμ-κουάτ, Φράπα): Για **Φυλλοκνίστη** με 35-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (50-70 κ.εκ σκευάσμ./στρ). Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-140 λίτρα / στρέμμα.


Για **Πράσινη αφίδα, Αφίδα Βαμβακιού και Μαύρη αφίδα** με 25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-140 λίτρα / στρέμμα. Για **Κόκκινη ψώρα, Παρλατόρια και Ψευδόκοκκο** με 50-70 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (150 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-200 λίτρα / στρέμμα.

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Για **Φυλλορύκτες** με 25-35 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα. Για **Πράσινη αφίδα** με 15-25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (25



κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα / στρέμμα. Για **Ρόδινη αφίδα** και **Αφίδα αχλαδιού** με 25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα. Για **Καρπόκαψα** με 35-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός με την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα. Για **Οπλοκάμνη** με 35-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα.


Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά: Για **Πράσινη αφίδα, Φυλλορύκτες** και **Τζιτζικάκια** με 25-35 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα. Για **Αφίδες** (Hyalorpterus rugini, Vnachyscaudus sp.,) με 25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα. Για **Καρπόκαψα** και **Ανάρσια** με 35-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα



ψεκαστικού υγρού (50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα. Για **Θρίπες** με 35-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα / στρέμμα.

Δαμασκινιά: Για **Αφίδες** και **Φυλλορύκτες** με 25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα / στρέμμα. Για **Καρπόκαψα** με 25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα / στρέμμα.


Κερασιά: Για **Ραγολέπη** με 25-35 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα. Για **Μαύρη αφίδα** με 15-25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα.



Ελιά: Για **Πυρηνωτρίτη** με 50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.) Ψεκασμός καλύψεως εναντίον της ανθόβιας και καρπόβιας γενιάς σύμφωνα με τις συστάσεις των τοπικών κέντρων γεωργικών προειδοποιήσεων. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα. Για **Δάκο της ελιάς** με 25-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.) Ψεκασμός καλύψεως σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα.

Αμπέλι (οινοποίηση και επιτραπέζιο): Για **Τζιτζικάκια** με 25-35 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 20-100 λίτρα / στρέμμα. Για **Ευδεμίδα** με 35-45 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 45 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός καλύψεως σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα.


Βαμβάκι: Για **Αφίδες** και **Καφέ Βρωμούσα** (χρήση ήσσονος σημασίας)* με μέγιστη δόση 20 κ.εκ. σκευάσμ./στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-80 λίτρα / στρέμμα.



Μαρούλι, Σκαρόλες και λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf), Κάρδαμο, Γεοκάρδαμο, Ρόκα και Κόκκινο σινάπι: Για **Αφίδες** (Nasonovia ribis-nigri) με δόση 25-35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα. Για **Αφίδες** (Macrosiphum euthorbiae, Myzus persicae) με δόση 20-25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα.

Πατάτα: Για **Δορυφόρο** με 10-15 κ.εκ. σκευάσμ./στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 40 λίτρα / στρέμμα. Για **Αφίδες** με δόση 20 κ.εκ. σκευάσμ./στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 30-60 λίτρα / στρέμμα.

Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (Υ & Θ): Για **Πράσινη αφίδα** με 20-25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (20-25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα. Για **Αλευρώδεις** με 35-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (35-50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-170 λίτρα / στρέμμα.



Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο (Υ): Για **Πλουτέλλα** με 25-35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα.

Ελαιοκράμβη: Για **Αφίδες** με δόση 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ. και για **Σκαθάρι της γύρης** με δόση 30 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα / στρέμμα.


Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο – Μεσοδιάστημα εφαρμογών:

Αμπέλι, Μαρούλι, Σκαρόλες και λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf): **Κάρδαμο, Γεοκάρδαμο, Ρόκα και Κόκκινο σινάπι, Κουνουπίδι (Υ), Μπρόκολο (Υ), Λάχανο (Υ): 1 εφαρμογή.**

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γρέιπ φρουτ, Λάιμ, Κουμ-κουάτ, Φράπα): **2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 30 ημερών.**

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) για Καρπόκαψα: **2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημερών.**

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) για όλους του υπόλοιπους εχθρούς, Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά), Δαμασκινιά, Βαμβάκι, Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα (υπαίθρου



και θερμοκηπίου): **2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 20 ημερών.**

Κερασιά, Ελιά: **2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημερών.**

Πατάτα, Ελαιοκράμβη: **2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών.**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


1.Χρησιμοποιείστε την μεγάλη δόση σε περίπτωση μεγάλης προσβολής.

2.Μην ψεκάζετε κατά την άνθηση των καλλιεργειών με εντομοφίλη επικονίαση.

3.Στην περίπτωση εφαρμογής δόσεων σε κ.εκ./100 λιτ. ψεκαστικού υγρού, η δόση να συνδυάζεται κατάλληλα με τον όγκο νερού ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα.

* «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στην Καφέ Βρωμούσα του βαμβακιού. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί



ή να αποκλειστεί: Διαχείριση της ανθεκτικότητας: Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα διαφορετικού τύπου δράσης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Εσπεριδοειδή (δόση 70 κ.εκ./ στρέμμα), Βαμβάκι, Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκινιά, Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λάχανο: **14 ημέρες**

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά Γκρέιπ-φρουτ): (δόση 150 κ.εκ./ στρέμμα): **60 ημέρες**

Εσπεριδοειδή (Λεμονιά, Μανταρινιά, Λάιμ, Κουμ κουάτ, Φράπα): (δόση 150 κ.εκ./ στρέμμα): **30 ημέρες**

Σκαρόλα και λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf): **10 ημέρες**

Αμπέλι (οινοποίηση και επιτραπέζια), Μαρούλι, Πατάτα, Πιπεριά (Υ&Θ), Μελιτζάνα (Υ), Τομάτα (Υ), Ελιά: **7 ημέρες**

Μελιτζάνα (Θ), Τομάτα (Θ), Κερασιά: **3 ημέρες**

Ελαιοκράμβη: **20 ημέρες**

Αριθμός Παρτίδας:

Ημερομηνία Παρασκευής/ Λήξης:

Βλέπε επί της συσκευασίας