

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

FARMA-CHEM SA



WG (βρέξιμο κόκκο)

Delfin WG

FARMA-CHEM SA

Delfin WG

Delfin WG

WG (βρέξιμο κόκκο)

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki (Btk), strain SA-11 65% β/β που ισοδυναμεί με 4.85X10^11 CFU/kg. 32000 IU/mg σε ενεργός πρωτεΐνη 6-επιδόκινη 6.4% Βοηθητικές ουσίες: 15 % β/β. Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14.594/02.02.2017

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ με ζωντανούς μικροοργανισμούς, με εκλεκτική δράση κατά προνύμφες λεπιδόπτερων. Δρα δια κατάποσης. Μετά την κατάποση οι προνύμφες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες.

- Φυλάσσετε κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
• Αποφεύγετε να αναπνεύετε τη σκόνη.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
• Τα μολυσμένα ενύματα εργασίας δεν πρέπει να βγίνουν από το χώρο εργασίας.
• Πλύνετε τα μολυσμένα ενύματα πριν τα ξανα χρησιμοποιήσετε.
• Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Φοράτε κατάλληλα γάντια, γυαλιά, μάσκα (για εφαρμογές σε θερμοκήπια) και ολόσωμη φόρμα κατά την ανάμιξη/φύρτωση και κατά την εφαρμογή.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Εργαστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Certis USA L.L.C.



Κάτοχος της έγκρισης: Mitsui AgriScience International S.A./N.V., Avenue de Tervuren 270 B-1150 Brussels, Βέλγιο.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανοτής: FARMA-CHEM SA. ΒΙ.Π.Ε. ΞΙΝΔΟΥ - Γ.ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΗΛ: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047 info@farmachem.gr - www.farmachem.gr

Ανοθεωμένα προϊόντα: Ερύσινα (Erythra eitella) με 50 γρ/100 λίτρα φεκ. υγρού ή 50-100 γρ. σε 200-400 λίτρα φεκ. υγρού/στρέμμα.
Νήξ, κρήνης (αφρώ, ένα καλά, περίοδο Μεσοβόσκησης εφρορηγών σε πηγές: Επαρθερωσία (Παρωσία), Μενταγιόνα, Κλάμπατος, Λεοντιά, Γκρέπ-φρουτ, Κίπρι: 2/7-10, Ακρόβουρα (Αμυγδαλιά, Φυσικά), Φουτουκιά, Μήλι, Αχλαδιά, Βερκοκιά, Ροβόκιά, Νεκταρινιά, Κερσάκι, Δαμασκηνιά, Ελιά, Μπανάνα, Αμπέλι, Φράουλα (μπαιθόρα και θερμοκήπιο), Τυμπάκι, Πατάρι, Μελιτζάνα, Μπάρα (γλυκίστα και θερμοκήπιο), Αγγούρι, Αγγουράκι, Καλαμίνι, Πεπόνι, Καρπούζι (γλυκίστα και θερμοκήπιο), Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο, Λαχανάκι Βραδείλλιαν, κ.α., Μαρούλι κ.α. σαλάτα (παρόλα (παρόλα), κάρδαμο, Φύλλο και βλαστό του ελάου brassica), Σπαράκι, Σέσκουλα, Λιχνό, Μάραθο, Αντά (γλυκίστα και θερμοκήπιο), Τρόσο, Αγκινάρα, Γλυκό κολοκύθι, Σαλάκι, Μπιζελιά (παρόλα), Βαθύκι, Καλαμίνι, Κανόνι, Καλαματικά φυτά, Ανθοκήποι. Έως 6 συγχόμετες εφρορηγές/7. Ανοθεωμένα προϊόντα: 1. Παρρησιές: 1. Νουστός μάλα φασόλι ο νεοός προνύμφες (πρώτου και δεύτερου στάθμης) και παρατηρήθων οι πρώτες θήκες και επαναλάτε κατά διαστήματα από ο πληθυσμός να κρατήρι χαμηλό. 2. Οι εφρορηγές να γίνεται τις άροσερές άρες της ημέρας για να αποφευχθεί η υψηλή UV ακτινοβολία. 3. Χρησιότατο καλό λούσιμο όλων της φυλλώσης εφρορηγές γιατί το φασόλι δρα δια κατάποσης. 4. Το ελάου των δένων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προβόλης. 5. Μην φεκάσετε εάν ανέμεται βροχή. Εάν βρέξει σε διάστημα 24 ωρών από φεκάσο, τότε ο φεκάσο θα πρέπει να επαναληφθεί.

Ειδικές ανάγκες γεωργικής, φυτογίας ή περιβατολογικής από τις οποίες το σκευάσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή απολαύσει: Διοχρήσιμη Ανοθεωτική: Μερει διαπιστωθεί ότι το έντομο αναπτύσσου αναθεωτάται σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται συνεχώς για την καταπολέμηση τους. Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανεπιθύων συστάτων η ανάλυση σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο άροση. Χρονικό Ανοθεωτικό: Μερει διαπιστωθεί ότι το έντομο αναπτύσσου αναθεωτάται σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται συνεχώς για την καταπολέμηση τους. Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανεπιθύων συστάτων η ανάλυση σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο άροση. Τρόπος εφρορηγής: Φεκάσοι φυλλώματος. Ελάου για την ευλεβία και κοχυλίδα στο αμπέλι ο φεκάσοι γίνε τον στην ζώνη των τοαυμάτων. Τρόπος παρασκευής του φεκάσοι υγρού: Γεμίστε το δοχείο του φεκάσοι μερηνόματος με νερό μέχρι τη μέση, διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε λιγ νερό. Προβόσημε το πιανό διάλυμα στο φεκάσοι δοχείο αναθεωτών. Συμπληρώστε το φεκάσοι με το υπόλοιπο νερό συνεχώντος την ανάλυση. Μην αφήσετε το φεκάσοι διάλυμα για πάνω από 12 ώρες. Καθωρημένη φεκάσοι: Αποδοσία τελείας το φεκάσοι βυθίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Επλάινετε το βυθίο και όλα τα εξάρτηματα του φεκάσοι, τρεις φορές με καθαρό νερό. Σηνωθεωπάτητα: Δεν ανουθεύεται με σκευάσματα που έχουν αλκαλική ανούθη. Φωτοαθεωπάτητα: Δεν είναι φωτοθεώλι όταν εφρορηγεται σύμφωνα με τις ανουθενόμενες χρήσεις, δόσεις και οδηγίες εφρορηγής. Τελετωσία επεβρωη την συγκορήση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκορήσης. Σηνωθεωπάτητα: Χρονικό σταθερομέτρη του σκευάσματος: Ανοθεωσιεται στην αρχή του κλάστη σκευάσματος, σε χώρο έρω και άροση σε θερμοκήπιο < 30C, προστατευμένο από την άμορη ήλιοη ακτινοβολία. Σης παραπάνω ανούθη παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

Τρόπος εφρορηγής: Φεκάσοι φυλλώματος. Ελάου για την ευλεβία και κοχυλίδα στο αμπέλι ο φεκάσοι γίνε τον στην ζώνη των τοαυμάτων. Τρόπος παρασκευής του φεκάσοι υγρού: Γεμίστε το δοχείο του φεκάσοι μερηνόματος με νερό μέχρι τη μέση, διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε λιγ νερό. Προβόσημε το πιανό διάλυμα στο φεκάσοι δοχείο αναθεωτών. Συμπληρώστε το φεκάσοι με το υπόλοιπο νερό συνεχώντος την ανάλυση. Μην αφήσετε το φεκάσοι διάλυμα για πάνω από 12 ώρες. Καθωρημένη φεκάσοι: Αποδοσία τελείας το φεκάσοι βυθίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Επλάινετε το βυθίο και όλα τα εξάρτηματα του φεκάσοι, τρεις φορές με καθαρό νερό. Σηνωθεωπάτητα: Δεν ανουθεύεται με σκευάσματα που έχουν αλκαλική ανούθη. Φωτοαθεωπάτητα: Δεν είναι φωτοθεώλι όταν εφρορηγεται σύμφωνα με τις ανουθενόμενες χρήσεις, δόσεις και οδηγίες εφρορηγής. Τελετωσία επεβρωη την συγκορήση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκορήσης. Σηνωθεωπάτητα: Χρονικό σταθερομέτρη του σκευάσματος: Ανοθεωσιεται στην αρχή του κλάστη σκευάσματος, σε χώρο έρω και άροση σε θερμοκήπιο < 30C, προστατευμένο από την άμορη ήλιοη ακτινοβολία. Σης παραπάνω ανούθη παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

Σηνωθεωπάτητα: Δεν ανουθεύεται με σκευάσματα που έχουν αλκαλική ανούθη. Φωτοαθεωπάτητα: Δεν είναι φωτοθεώλι όταν εφρορηγεται σύμφωνα με τις ανουθενόμενες χρήσεις, δόσεις και οδηγίες εφρορηγής. Τελετωσία επεβρωη την συγκορήση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκορήσης. Σηνωθεωπάτητα: Χρονικό σταθερομέτρη του σκευάσματος: Ανοθεωσιεται στην αρχή του κλάστη σκευάσματος, σε χώρο έρω και άροση σε θερμοκήπιο < 30C, προστατευμένο από την άμορη ήλιοη ακτινοβολία. Σης παραπάνω ανούθη παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΑΡ. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ. ΑΗΕ.: βρέει επί της συσκευασίας

Πεδίο εφαρμογής - Τύπος - Δόση - Χρόνος εφαρμογής

Επαρθεωσία (Παρωσία), Μονταγιόνα, Κλάμπατος, Λεοντιά, Γκρέπ-φρουτ, Κίπρι: Ανούθη (Phys oti), Ανοθεω προνύμφες λεπιδόπτερων με 25 γρ/100 λίτρα φεκ. υγρού ή 50-100 γρ. σε 200-400 λίτρα φεκ. υγρού/στρέμμα.
Νήξ, κρήνης (αφρώ, ένα καλά, περίοδο Μεσοβόσκησης εφρορηγών σε πηγές: Επαρθερωσία (Παρωσία), Μενταγιόνα, Κλάμπατος, Λεοντιά, Γκρέπ-φρουτ, Κίπρι: 2/7-10, Ακρόβουρα (Αμυγδαλιά, Φυσικά), Φουτουκιά, Μήλι, Αχλαδιά, Βερκοκιά, Ροβόκιά, Νεκταρινιά, Κερσάκι, Δαμασκηνιά, Ελιά, Μπανάνα, Αμπέλι, Φράουλα (μπαιθόρα και θερμοκήπιο), Τυμπάκι, Πατάρι, Μελιτζάνα, Μπάρα (γλυκίστα και θερμοκήπιο), Αγγούρι, Αγγουράκι, Καλαμίνι, Πεπόνι, Καρπούζι (γλυκίστα και θερμοκήπιο), Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο, Λαχανάκι Βραδείλλιαν, κ.α., Μαρούλι κ.α. σαλάτα (παρόλα (παρόλα), κάρδαμο, Φύλλο και βλαστό του ελάου brassica), Σπαράκι, Σέσκουλα, Λιχνό, Μάραθο, Αντά (γλυκίστα και θερμοκήπιο), Τρόσο, Αγκινάρα, Γλυκό κολοκύθι, Σαλάκι, Μπιζελιά (παρόλα), Βαθύκι, Καλαμίνι, Κανόνι, Καλαματικά φυτά, Ανθοκήποι. Έως 6 συγχόμετες εφρορηγές/7. Ανοθεωμένα προϊόντα: 1. Παρρησιές: 1. Νουστός μάλα φασόλι ο νεοός προνύμφες (πρώτου και δεύτερου στάθμης) και παρατηρήθων οι πρώτες θήκες και επαναλάτε κατά διαστήματα από ο πληθυσμός να κρατήρι χαμηλό. 2. Οι εφρορηγές να γίνεται τις άροσερές άρες της ημέρας για να αποφευχθεί η υψηλή UV ακτινοβολία. 3. Χρησιότατο καλό λούσιμο όλων της φυλλώσης εφρορηγές γιατί το φασόλι δρα δια κατάποσης. 4. Το ελάου των δένων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προβόλης. 5. Μην φεκάσετε εάν ανέμεται βροχή. Εάν βρέξει σε διάστημα 24 ωρών από φεκάσο, τότε ο φεκάσο θα πρέπει να επαναληφθεί.

Πρώτες Βοηθεις - Αντιόθη:
• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβούλη, να έχετε μαζί σας τον περιόκη του προϊόντος ή την ετικέτα.
• Σε περιόκη ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άρονο νερό και σαπούνι.
• Εάν παρατηρήσει ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
• Πλύνετε τα μολυσμένα ενύματα πριν τα εναπορησιμοποιήσετε.
• Σε περιόκη εφροής με τα μάτια: Επλάινετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φεκάσοι εφροή, αφαιρέστε τους, εφροή είναι εύκολο.
• Σε περιόκη εναοής: Μεταφέρτε τον πόθηνο στον καθαρό αέρα.
Αντιόθη: Δεν υπάρχει ειόκη αντιόθη. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 210-7793777

Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκευάσο ή τη συσκευασία του. Περιέχει Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki (Btk), strain SA-11. Μπορεί να προκαόσει ευαισθητοποίηση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρη της συσκευασίας: Τα κενά μέσο συσκευασίας μαζί με τα κουτιά, που θα καταστραφούν προηγομένως με ακιόση για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποθείνονται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενεργείας.

Kaθ. Βάρος: 100 γραμ.

