14. Φάσμα δράσης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	**ΣΤΟΧΟΙ**	**ΔΟΣΕΙΣ**	**ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**
Οικιακοί και επαγγελματικοί χώροι, δημόσια κτίρια και γραφεία, γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, εσωτερική και εξωτερική χρήση	**μυρμήγκια** (ακμαία και προνύμφες του Lasius niger), **κοριοί** (ακμαία και νύμφες του Cimex lectularius), **σκαθάρι απορριμμάτων** (ακμαία και προνύμφες του Alphitobius diaperinus), **κατσαρίδες** (ακμαία και νύμφες των Blatta orientalis, Blatella germanica) **άκαρι των πουλερικών** (ακμαία και νύμφες του Dermanyssus gallinae), **Οικιακή μύγα και μύγες των στάβλων** (Musca domestica, Chrisomya megacephala, Haematobia irritans και Stomoxys calcitrans), **κουνούπια** (Culex pipiens, Aedes sp., Anopheles sp.), **κουνούπια τίγρης** (Aedes albopictus)	**Εφαρμογή με ψεκασμό επιφανειών**: **100 κ.εκ**. σε 5 λίτρα νερό* για επιφάνεια **100 τετραγωνικών μέτρων**	Εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Επαναλάβετε την εφαρμογή μετά από 3 μήνες εάν χρειαστεί.
	Σφήκες (Vespula vulgaris, Vespa velutina)	**Εφαρμογή στις Σφηκοφωλιές ή απευθείας στα έντομα σε δόση 50 κ.εκ. από ψεκαστικό διάλυμα 100 κ.εκ. σε 5 λίτρα νερό**	

Οικιακοί και επαγγελματικοί χώροι, δημόσια κτήρια και γραφεία, γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις	**κοριοί** (ακμαία και νύμφες του Cimex lectularius), **σκαθάρι απορριμμάτων** (ακμαία και προνύμφες του Alphitobius diaperinus), **κατσαρίδες** (ακμαία και νύμφες των Blatta orientalis, Blatella germanica) **άκαρι των πουλερικών** (ακμαία και νύμφες του Dermanyssus gallinae), **Οικιακή μύγα και μύγες των στάβλων** (Musca domestica, Chrisomya megacephala, Haematobia irritans και Stomoxys calcitrans)	**Εφαρμογή με ψεκασμό στον αέρα σε <u>κλειστούς χώρους</u>** **Με θερμικό νεφελο-ψεκαστήρα** ***(Hot fogging):*** **100 κ.εκ.** BOMBEX® FARUMY (αδιάλυτο) για **500 κυβικά μέτρα.** **Με κρύο νεφελο-ψεκαστήρα** ***(Cold fogging):*** **100 κ.εκ. σε 5 λίτρα νερό *** για **500 κυβικά μέτρα**	

Παρατηρήσεις:

*Η αναγκαία ποσότητα νερού εξαρτάται από την κατάσταση της επιφάνειας και τον εξοπλισμό εφαρμογής. Για καλύτερη αποτελεσματικότητα καθαρίστε τις επιφάνειες πριν εφαρμόσετε το προϊόν. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές πριν την εφαρμογή του προϊόντος

Το σκεύασμα έχει υπολειμματική διάρκεια δράσης 3 μήνες (ανάλογα τις περιβαλλοντικές συνθήκες και την επιφάνεια εφαρμογής).

Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν φυσάει ή σε περίπτωση βροχής

- **Σε χώρους όπου οι άνθρωποι και τα κατοικίδια ζώα μπορούν να έρθουν σε επαφή με το ψεκασμένο σκεύασμα,** εφαρμόστε το προϊόν σε λωρίδες ή μόνο σε σημεία όπως ρωγμές-χαραμάδες- σχισμές**.**
- **Περιμετρική εφαρμογή:** ψεκάστε μια συνεχή ζώνη 20 έως 30 εκ. πλάτος σχηματίζοντας ένα αποτελεσματικό φράγμα γύρω από πόρτες, παράθυρα και ανοίγματα, με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία όπου τα έντομα συνήθως κρύβονται.
- **Σφηκοφωλιές:** Εφαρμόστε απευθείας στη φωλιά και ειδικά γύρω από την είσοδο, μέχρι να εμποτιστεί καλά. Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται το σούρουπο όταν τα έντομα έχουν ελάχιστη κινητικότητα, με κατάλληλο εξοπλισμό ψεκασμού (με μακρινή λόγχη/μπάρα) και προστατευτικά ενδύματα γάντια και μπότες. Καταστρέψτε τη φωλιά μετά τον ψεκασμό. Κρατήστε μακριά ανθρώπους και ζώα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- **Φωλιές μυρμηγκιών**: Εφαρμόστε σε μία περιοχή ενός (1) τετρ. μέτρου γύρω από τη φωλιά και μία ζώνη 10 εκατοστών στα μονοπάτια των μυρμηγκιών.
- **Γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις:** μπορείτε να ψεκάσετε σε επιφάνειες, παρουσία ζώων. Μην εφαρμόζετε απευθείας στα ζώα.