



GR86730073A



FLIPPER®

1L e

Γαλάκτωμα, λάδι σε νερό (EW)

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Άλατα καλίου λιπαρών οξέων (fatty acids potassium salt): 47,98 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 51 % β/β

Έντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο

για την καταπολέμηση αλευρωδών, τετράνυχων, αφίδων και άλλων εχθρών ήσσονος σημασίας σε διάφορες καλλιέργειες υπαίθρου και θερμοκηπίου.

Κάτοχος της έγκρισης: ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED
St. John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Αγγλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Bayer Ελλάς ABEE, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι. Τηλ: 210 6166374, Fax: 210 6109100

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά ΥΑΑΤ:
14577 / 01-09-2016

ΠΡΟΣΟΧΗ



**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

Το FLIPPER® είναι κατοχυρωμένο
εμπορικό σήμα της Alpha BioPesticides Limited

900

800

700

600

500

400

300

200

ΦΛΙΠΕΡ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο για την καταπολέμηση αλευρωδών, τετράνυχων, αφίδων και άλλων εχθρών ήσσονος σημασίας σε διάφορες καλλιέργειες υπαίθρου και θερμοκηπίου. Δρα δι' επαφής και έχει άμεση δράση («knock down») κατά ακμαίων και προνυμφών. Εμφανίζει κάποια δράση στα ωά. Τα αποτελέσματα είναι ορατά 48 ώρες μετά την εφαρμογή. Δρα με φυσικό τρόπο, διατηρώντας τη λειτουργία του λιποπρωτεϊνικού πλέγματος της κυτταρικής μεμβράνης των εχθρών, προκαλώντας το θάνατό τους, με άμεσο αποτέλεσμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης φυλλώματος εξασφαλίζοντας καλή κάλυψη και στις δυο όψεις των φύλλων.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας. Προσθέστε το διάλυμα στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Μην χρησιμοποιείτε σκληρό νερό για την προετοιμασία του ψεκαστικού διαλύματος. Μην αφήσετε το έτοιμο διάλυμα για πολύ ώρα, χρησιμοποιήστε το μετά την προετοιμασία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε δυο φορές το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού μηχανήματος με καθαρό νερό και απορρυπαντικό.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Να μη συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα και με σκευάσματα που περιέχουν ιόντα θείου ή μετάλλων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

ΦΡΑΟΥΛΑ (θερμοκηπίου), ΤΟΜΑΤΑ (θερμοκηπίου), ΑΓΓΟΥΡΙ (θερμοκηπίου): Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), **Αλευρώδεις** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*). **Δόση:** 1-1,6 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (1,6 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-100 λίτρα/στρ.

ΤΟΜΑΤΑ (υπαίθρου): **Αλευρώδεις** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), **Τετράνυχος** (*Tetranychus urticae*), **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΣΜΕΟΥΡΑ (θερμοκηπίου & υπαίθρου)² (Rasberries, Blackberries, Blueberries): Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Θρίπας** (*Thrips* sp.), **Drosophilla suzukii**. **Δόση για θερμοκήπιο:** 1-1,6 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (1,6 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-160 λίτρα/στρ. **Δόση για υπαίθρο:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΑΓΚΙΝΑΡΑ²: Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ²: Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), **Euphyllura sp.**, **Metcalfa sp.**, **Pseudaulacaspis pentagona**. **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΑΜΠΕΛΙ² (επιπραπέζιο και οινοποίησημο): Θρίπας (*Frankliniella occidentalis*), **Drosophila suzukii**, **Metcalfa pruinosa**, **Κοκκοειδή** (*Pseudococcus citri*, *Planococcus ficus*, *Parthenolecanium corni*, *Pulvinaria vitis*). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ²: Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Κοκκοειδή** (*Sphaerolectanium prunastri*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Lepidosaphes ulmi*, *Melanaspis inopinata*, *Aeonidiella aurantii*, *Quadraspidiotus perniciosus*, *Pseudococcus* sp.), **Cydia molesta**, **Anarsia lineatella**. **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΑΝΤΙΔΙ² (θερμοκηπίου & υπαίθρου): **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Euphyllura sp.**, **Metcalfa pruinosa**. **Δόση για θερμοκήπιο:** 1-1,6 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (1,6 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-160 λίτρα/στρ. **Δόση για υπαίθρο:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΜΠΙΖΕΛΙ²: **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ² (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ): Θρίπας (*Thrips* sp.), **Drosophila suzukii**, **Rhynchites bacchus**, **Cacoecia podana**, **Adoxophyes orana**. **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ²: Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), **Laspeyresia funebrana**. **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΚΑΠΝΟΣ²: **Αφίδες** (*Myzus nicotianae*, *Myzus* spp., *Aphis* spp.), **Θρίπες** (*Thrips tabaci*, *Thrips* sp.), **Αλευρώδης** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΚΑΡΥΔΙΑ²: **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Cydia pomonella**, **Stictoccephala bisonia**. **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΚΕΡΑΣΙΑ²: **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*, *Myzus cerasi*), **Κοκκοειδή** (*Quadraspidiotus perniciosus*), **Drosophila suzukii**, **Θρίπας** (*Thrips* sp.), **Spilonota ocellana**, **Ραγολέτιδα** (*Rhagoletia cerasi*), **Τετράνυχος** (*Tetranychus urticae*, *Panonychus ulmi*). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ²: **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Αλευρώδης** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ ΧΛΩΡΟ²: **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Αλευρώδης** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), **Θρίπας** (*Frankliniella occidentalis*), **Aceria tulipae**, **Dyspessa ulula**. **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΚΡΕΜΜΥΔΙ²: **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Θρίπας** (*Frankliniella occidentalis*), **Aceria tulipae**, **Dyspessa ulula**. **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΜΑΡΟΥΛΙ (θερμοκηπίου & υπαίθρου)²: **Αλευρώδης** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), **Θρίπας** (*Frankliniella occidentalis*), **Κοφτοσκούληκα** (*Agrotis* sp.). **Δόση για θερμοκήπιο:** 1-1,6 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (1,6 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-160 λίτρα/στρ. **Δόση για υπαίθρο:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (θερμοκηπίου & υπαίθρου)²: Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), **Αλευρώδης** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), **Θρίπας** (*Frankliniella occidentalis*). **Δόση για θερμοκήπιο:** 1-1,6 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (1,6 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-160 λίτρα/στρ. **Δόση για υπαίθρο:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ* (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά): **Θρίπας** (*Thrips* sp.), *Eriosoma lanigerum*, *Ceresa bubalus*, *Calocoris* sp. **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΜΠΑΜΙΑ*: **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Αλευρώδης** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), **Τετράνυχος** (*Tetranychus urticae*), **Θρίπας** (*Frankliniella occidentalis*). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΜΠΡΟΚΟΛΟΣ*: **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Αλευρώδης** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), **Τετράνυχος** (*Tetranychus urticae*). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΠΑΝΤΖΑΡΙ*: **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Θρίπας** (*Thrips* sp.), **Ψύλλα** (*Psylla alni*). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΠΡΑΣΟ*: **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Τετράνυχος** (*Tetranychus urticae*), **Θρίπας** (*Thrips* sp.), **Ψύλλα** (*Psylla alni*). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΡΕΒΥΘΙ*, **ΦΑΚΗ***: **Τετράνυχος** (*Tetranychus urticae*), **Θρίπας** (*Thrips* sp.). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΡΟΔΙΑ*: **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Αλευρώδης** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), **Θρίπας** (*Thrips* sp.), **Τετράνυχος** (*Tetranychus urticae*). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΡΟΚΑ (θερμοκηπίου)*: **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Αλευρώδης** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), **Τετράνυχος** (*Tetranychus urticae*), **Θρίπας** (*Frankliniella occidentalis*), **Ψύλλα** (*Psylla alni*). **Δόση:** 1-1,6 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (1,6 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-160 λίτρα/στρ.

ΣΚΟΡΔΟ*: **Θρίπας** (*Frankliniella occidentalis*). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΣΠΑΝΑΚΙ*: **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Θρίπας** (*Thrips tabaci*, *Thrips* spp., *Frankliniella occidentalis*), **Ψύλλα** (*Psylla alni*). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΦΑΣΟΛΙ ΞΕΡΟ*: **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Αλευρώδης** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), **Θρίπας** (*Thrips* sp.). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΕΛΙΑ*: *Calocoris trivialis*, **Κοκκοειδή** (*Saissetia oleae*, *Polinia pollini*, *Leucaspis riccae*, *Aspidiotus nerii*), **Βαμβάκαδα** (*Euphyllura olivina*). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΓΚΡΕΙΠ-ΦΡΟΥΤ*, **ΛΑΙΜ***: **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Τετράνυχος** (*Tetranychus urticae*), **Κοκκοειδή** (*Aonidiella citrina*, *Aspidiotus nerii*, *Aonidiella aurantii*, *Planococcus citri*, *Pseudaulaspis pentagona*), **Θρίπας** (*Thrips* sp.), **Αλευρώδης** (*Aleurothrix floccosus*, *Dialeurodes citri*). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΦΙΣΤΙΚΙΑ*: **Τετράνυχος** (*Tetranychus urticae*), **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Κοκκοειδή** (*Melanaspis* sp.), **Θρίπας** (*Thrips* sp.). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ*: **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Metcalfa**

pruinosa, **Θρίπας** (*Thrips* sp.), **Κοκκοειδή** (*Eulecanium tiliae*, *Parthenolacanium corni*, *Ceroplastes sinensis*, *Saissetia oleae*, *Coccus hesperidum*). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ*: **Τετράνυχος** (*Tetranychus urticae*), **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Θρίπας** (*Thrips* sp.). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΥΦΕΡΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ* (**ΣΠΑΝΑΚΙ, ΜΑΡΟΥΛΙ, ΦΥΛΛΑ ΣΤΑΥΡΑΝΘΩΝ, ΡΟΚΑ**): **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Αλευρώδης** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), **Τετράνυχος** (*Tetranychus urticae*), **Θρίπας** (*Frankliniella occidentalis*). **Δόση:** 1-1,6 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (1,6 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-160 λίτρα/στρ.

ΑΒΟΚΑΝΤΟ*: **Τετράνυχος** (*Tetranychus urticae*), **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Θρίπας** (*Thrips* sp.), **Αλευρώδης** (*Aleurothrix floccosus*), **Κοκκοειδή** (*Pseudococcus* sp.). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΜΠΑΝΑΝΑ* (θερμοκηπίου): **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Θρίπας** (*Thrips* sp.), **Τετράνυχος** (*Tetranychus urticae*), **Αλευρώδης** (*Aleurothrix* sp.), **Κοκκοειδή** (*Planococcus citri*). **Δόση:** 1-1,6 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (1,6 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-160 λίτρα/στρ.

ΜΠΑΝΑΝΑ (υπαίθρου)*: **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Θρίπας** (*Thrips* sp.), **Τετράνυχος** (*Tetranychus urticae*), **Αλευρώδης** (*Aleurothrix* sp.), **Κοκκοειδή** (*Planococcus citri*). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΛΩΤΟΣ*: **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Αλευρώδης** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), **Τετράνυχος** (*Tetranychus urticae*), **Θρίπας** (*Frankliniella occidentalis*), **Κοκκοειδή** (*Pseudococcus viburni*, *Parthenolacanium corni*, *Planococcus ficus*, *Planococcus citri*, *Parlatoria oleae*). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΣΥΚΙΑ*: **Τετράνυχος** (*Tetranychus urticae*), **Κοκκοειδή** (*Ceroplastes* sp.), **Ψύλλα** (*Homotoma ficus*). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (θερμοκηπίου)* (**ΡΙΓΑΝΗ, ΘΥΜΑΡΙ, ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑ, ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ, ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, ΜΕΝΤΑ, ΚΟΛΙΑΝΔΡΟ**): **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Αλευρώδης** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), **Τετράνυχος** (*Tetranychus urticae*), **Θρίπας** (*Thrips* sp.). **Δόση:** 1-1,6 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (1,6 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-160 λίτρα/στρ.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (υπαίθρου)* (**ΡΙΓΑΝΗ, ΘΥΜΑΡΙ, ΘΡΟΥΜΠΙ, ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ, ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ**): **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Αλευρώδης** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), **Τετράνυχος** (*Tetranychus urticae*), **Θρίπας** (*Thrips* sp.). **Δόση:** 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-200 λίτρα/στρ.

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ (θερμοκηπίου)*, **ΣΕΛΙΝΟ (θερμοκηπίου)***, **ΣΠΟΡΕΙΑ***: **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), **Αλευρώδης** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), **Τετράνυχος** (*Tetranychus urticae*), **Θρίπας** (*Thrips* sp.). **Δόση:** 1-1,6 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (1,6 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-160 λίτρα/στρ.

ΣΕΛΙΝΟ (αγρού)², ΜΑΡΑΘΟ²: Αφίδες (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), Αλευρώδεις (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Θρίπας (*Thrips* sp.). Δόση: 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 30-200 λίτρα/στρ.

ΓΛΥΚΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ², ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟ², ΚΟΛΟΚΥΘΑ²: Αφίδες (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Θρίπας (*Thrips* sp.). Δόση: 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 30-200 λίτρα/στρ.

ΡΑΠΑΝΑΚΙ²: Αφίδες (*Aphis gossypii*, *A. fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*), Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Θρίπας (*Thrips* sp.), Αλευρώδεις (*Trialeurodes* sp., *Bemisia* sp., *Aleyrodes* sp.), Ψύλλα (*Psylla* sp.). Δόση: 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 30-200 λίτρα/στρ.

ΣΠΑΡΑΓΓΙ²: Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), Θρίπας (*Thrips* sp.), *Brachycorynella asparagi*. Δόση: 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (2 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 30-200 λίτρα/στρ.

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ²: ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΓΚΡΕΪΦ-ΦΡΟΥΪΤ, ΛΙΜΕΤΤΙΑ, ΠΕΡΓΑΜΟΝΤΟ: Αλευρώδης (*Aleurocanthus spiniferus*). Δόση: 1-2,5 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (1 λίτρο/100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 80-250 λίτρα/στρ.

ΑΜΠΕΛΙ² (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): Αλευρώδης (*Aleurocanthus spiniferus*). Δόση: 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (1 λίτρο/100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 30-200 λίτρα/στρ.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ²: Αλευρώδης (*Aleurocanthus spiniferus*). Δόση: 1-2 λίτρα/στρέμμα (min-max)³ (1 λίτρο/100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 30-200 λίτρα/στρ.

Παρατηρήσεις:

- 1) Επιτρέπεται η χρήση του σκευάσματος κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας και κατά την περίοδο παραγωγής εκκρίσεων, απουσία μελισσών.
- 2) Για τις καλλιέργειες αυτές δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.
- 3) Η προτεινόμενη συγκέντρωση σκευάσματος για όλες τις περιπτώσεις είναι 1 λίτρο/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Σε περιπτώσεις έντονης προσβολής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερη συγκέντρωση με μέγιστο τα 2 λίτρα σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού με μέγιστο όγκο νερού τα 100 λίτρα για τις καλλιέργειες ανοιχτού αγρού και τα 80 λίτρα για τις καλλιέργειες υπό κάλυψη.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ / ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:

- Καλλιέργειες θερμοκηπίου: Φράουλα, Τομάτα, Αγγούρι, Σμέουρα, Αντίδι, Μαρούλι, Μελτζάνα, Ρόκα, Καλλιέργειες Τρυφερών Φύλλων Θερμοκηπίου (Σπανάκι, Μαρούλι, Φύλλα Σταυρανόων, Ρόκα), Μπανάνα, Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά (Ρίγανη, Θυμάρι, Μαντζουράνα, Δενδρολίβανο, Φασκόμηλο, Βασιλικός, Μέντα, Κόλιανδρο): 5 / 7
- Σπορεία, Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες) για την αντιμετώπιση του Αλευρώδη (*Aleurocanthus spiniferus*), Τριαντάφυλλα για την αντιμετώπιση του Αλευρώδη (*Aleurocanthus spiniferus*): 5 / 7
- Εσπεριδοειδή: Πορτοκάλια, Μανταρίνια, Κλημεντίνες, Λεμόνια, Γκρεϊφ-Φρουϊτ, Λιμεττία, Περγαμόντο για την αντιμετώπιση του Αλευρώδη (*Aleurocanthus spiniferus*): 4 / 7.
- Τομάτα (υπαίθρου), Σμέουρα (υπαίθρου), Αγκινάρα, Ακνίδιο, Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο), Αμυγδαλιά, Αντίδι (υπαίθρου), Μπιζέλι, Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά), Δαμασκηλιά, Καπνός, Καρυδιά, Κερασιά, Κουνοσιπίδι, Κρεμμυδάκι

Χλωρό, Κρεμμύδι, Μαρούλι (υπαίθρου), Μελτζάνα (υπαίθρου), Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά), Μπάμια, Μπρόκολο, Παντζάρι, Πράσο, Ρεβύθι, Ροδιά, Σκόρδο, Σπανάκι, Φακιά, Φασόλι Ξερό, Ελιά, Γκρεϊφ-Φρουϊτ, Λάιμ, Φιστικιά, Φουντουκιά, Γλυκοπατάτα, Αβοκάντο, Μπανάνα (υπαίθρου), Λωτός, Συκιά, Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά (υπαίθρου) (Ρίγανη, Θυμάρι, Θρούμπι, Δενδρολίβανο, Φασκόμηλο, Βασιλικός, Μαϊντανός (θερμοκηπίου), Σέλινο (θερμοκηπίου & αγρού), Μάραθο, Γλυκό Καλαμπόκι, Ζαχαρότευτλο, Ραπανάκι, Κολοκύθα, Σπαράγγι: 1 εφαρμογή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Όλες οι καλλιέργειες: 3 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΎΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Για καλύτερη αποτελεσματικότητα θα πρέπει να εφαρμοστεί νωρίς με την εμφάνιση της προσβολής, στοχεύοντας τα αυγά και τα πολύ νεαρά προνυμφικά στάδια, έτσι ώστε να αποφευχθεί η αύξηση του πληθυσμού των εχθρών. Καταπολεμάει εχθρούς ανθεκτικούς σε άλλα εντομοκτόνα – ακαρεοκτόνα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

- ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα πάνω στα φυτά (24 ώρες).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις δόσεις και καλλιέργειες που συνιστάται και κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό ξεπλυσμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να αναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Φυλάσσεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε συσκευασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
- Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Φοράτε προστατευτικά γάντια (NBR gloves EN374-3) και μάσκα για τα μάτια (EN166, ΨΕ, 3).
- Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα 20 μέτρων με φυτική κάλυψη, σε υπαίθριες καλλιέργειες.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΙΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

Γραμμή **έκτακτης ανάγκης** Bayer
από σταθερό: **800 1135 353**
από κινητό: **210 6166 332**

24/7



Bayer

Bayer Ελλάς ABEE
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100
www.cropscience.bayer.gr

GR86730073A



5 200309 817575 >



FLIPPER®

1L e

Γαλάκτωμα, λάδι σε νερό (EW)

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Άλατα καλίου λιπαρών οξέων (fatty acids potassium salt): 47,98 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 51 % β/β

Έντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο

για την καταπολέμηση αλευρωδών, τετράνυχων, αφίδων και άλλων εχθρών ήσσονος σημασίας σε διάφορες καλλιέργειες υπαίθρου και θερμοκηπίου.

Κάτοχος της έγκρισης: ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED
St. John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Αγγλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Bayer Ελλάς ABEE, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι. Τηλ: 210 6166374, Fax: 210 6109100

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά YAAT:
14577 / 01-09-2016

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Το FLIPPER® είναι κατοχυρωμένο
εμπορικό σήμα της Alpha BioPesticides Limited